



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 006. PROVA OBJETIVA

#### AUXILIAR DE ENFERMAGEM

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira para responder às questões 01 e 02:

O Melhor de Calvin – Bill Waterson



(Bill Waterson, "O Melhor de Calvin". <https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos>, 04.04.2025)

01. Uma afirmação coerente com as informações da tira, e em conformidade com a norma-padrão, é:

- (A) Se o aluno tivesse esforçado-se para ter boas notas, não haveriam comentários da professora que afetariam sua autoestima.
- (B) A professora disse que o aluno dever-se-ia esforçar porque vem surgindo notas baixas que estão afetando sua autoestima.
- (C) "Me sinto afetado por esta nota ruim e pela sua negação do fato de que sou uma vítima" – disse ironicamente o menino.
- (D) A nota ruim e a negação do fato pela professora fizeram com que o aluno se sentisse mal, com a sua autoestima afetada.
- (E) É flagrante que a nota ruim do aluno é um fato isolado nos seus estudos, pois a professora não recriminou-o por aquilo.

02. Considerando a interlocução com o uso do pronome "Você", as informações do segundo quadrinho admitem a reescrita:

- (A) Então, esforce-se mais e não tire notas baixas.
- (B) Então, esforça-se mais e não tire notas baixas.
- (C) Então, esforce-se mais e não tira notas baixas.
- (D) Então, esforça-se mais e não tira notas baixas.
- (E) Então, esforças-se mais e não tires notas baixas.

### *Crianças condenadas à estagnação*

A probabilidade de um brasileiro nascer pobre e morrer pobre é alta. Menos de 2% das crianças cujos pais estão entre os 50% mais pobres do País alcançarão a renda dos 10% mais ricos. E o mais provável é que 66% delas ainda estejam na mesma faixa dos ascendentes quando chegarem à fase adulta da vida.

Essas projeções são do recém-lançado *Atlas da Mobilidade Social do Brasil*, do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS). O estudo sobre mobilidade intergeracional traça um cenário bastante desolador, haja vista que a imobilidade social no País parece ser a regra.

De acordo com o estudo, a mobilidade social é ainda difícil para as crianças do sexo feminino, negras e do Norte do País. Aliás, nos Estados dessa região, quase 80% das crianças cujos pais estão na metade mais pobre da população permanecerão nessa mesma situação na vida adulta.

Tudo isso indica que o Brasil desonrou compromissos firmados com o seu povo por meio da Constituição federal de 1988, que afirma que “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” são objetivos fundamentais da República. E é essa mesma Constituição que diz aos brasileiros que a criança é uma prioridade absoluta.

O ideal seria o país investir na primeira infância – inclusive para impedir que essas crianças, uma vez tornadas adultas, venham a depender, como os pais, de mais programas sociais. É nessa fase da vida que os estímulos adequados impactam a fase adulta, em educação, saúde, trabalho, renda, violência e redução da desigualdade. Apesar disso, o Brasil não alcançou nem mesmo a meta de colocar 50% das crianças de zero a 3 anos na creche. No ano passado, só cerca de 40% delas estavam matriculadas.

Se o País não cuida bem das crianças menores, tampouco cuida das maiores, dos adolescentes e dos jovens. Os indicadores de educação apontam que a qualidade do ensino brasileiro é baixa, com desempenho pífio em avaliações nacionais e internacionais. E o ensino profissionalizante não é uma prioridade.

O Brasil terá de fazer escolhas para romper esse ciclo. Se nada mudar, o País e milhões dos seus cidadãos estarão condenados a futuro algum.

(Opinião. Em: <https://www.estadao.com.br/opiniao>, 20.06.2025. Adaptado)

03. As informações do texto permitem concluir que

- (A) as crianças nascidas após a promulgação da Constituição federal tiveram os seus direitos básicos certamente garantidos.
- (B) as crianças vêm perdendo oportunidades de ascensão social porque se dedicam pouco às avaliações nacionais e internacionais.
- (C) as crianças cujos pais são pobres têm 50% de chances de ingressarem no grupo dos 10% mais ricos do país, quando adultas.
- (D) as crianças nascidas pobres tendem a ser adultos pobres, porque a mobilidade social praticamente inexiste no Brasil.
- (E) as crianças vislumbram muitas chances de uma vida melhor que a de seus pais, considerando educação, saúde, trabalho e renda.

04. A conclusão do texto sugere que

- (A) a oferta de futuro digno às crianças independe de mudanças realizadas por autoridades governamentais.
- (B) o futuro digno para as crianças de hoje exige que haja o rompimento com o ciclo de desigualdades sociais.
- (C) a melhor maneira de garantir dignidade aos adultos do futuro é com a manutenção da ordem social atual.
- (D) o rompimento com o ciclo de desigualdades sociais terá impacto praticamente nulo para o futuro das crianças.
- (E) o Brasil reconhece os direitos de seus cidadãos, embora não tenha condições de transformar a realidade social.

05. O termo destacado está empregado em sentido figurado em:

- (A) O estudo sobre mobilidade **intergeracional** traça um cenário bastante desolador... (2º parágrafo)
- (B) Tudo isso indica que o Brasil desonrou compromissos firmados com o seu **povo**... (4º parágrafo)
- (C) E é essa mesma Constituição que diz aos brasileiros que a criança é uma **prioridade** absoluta. (4º parágrafo)
- (D) Os indicadores de educação apontam que a **qualidade** do ensino brasileiro é baixa... (6º parágrafo)
- (E) Se nada mudar, o País e milhões dos seus cidadãos estarão **condenados** a futuro algum. (7º parágrafo)

06. Considere as passagens:

- O estudo sobre mobilidade intergeracional traça um cenário bastante **desolador**... (2º parágrafo)
- Os indicadores de educação apontam que a qualidade do ensino brasileiro é baixa, com desempenho **píffio** em avaliações nacionais e internacionais. (6º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) devastador; esplendoroso.
- (B) desanimador; insignificante.
- (C) desmotivador; contundente.
- (D) deslumbrante; equilibrado.
- (E) desmistificador; humilhante.

07. Na passagem do 6º parágrafo – Se o País não cuida **bem** das crianças menores, **tampouco** cuida das maiores, dos adolescentes e dos jovens. –, os termos destacados expressam, correta e respectivamente, sentido de

- (A) modo e finalidade.
- (B) afirmação e negação.
- (C) modo e negação.
- (D) afirmação e intensidade.
- (E) intensidade e finalidade.

08. Considere as passagens:

- E o mais provável é que 66% delas ainda estejam na mesma faixa dos ascendentes **quando** chegarem à fase adulta da vida. (1º parágrafo)
- **Apesar disso**, o Brasil não alcançou nem mesmo a meta de colocar 50% das crianças de zero a 3 anos na creche. (5º parágrafo)
- **Se** nada mudar, o País e milhões dos seus cidadãos estarão condenados a futuro algum. (7º parágrafo)

No contexto em que estão empregadas, as expressões destacadas exprimem, correta e respectivamente, sentidos de

- (A) conformidade; tempo; causa.
- (B) comparação; conclusão; fim.
- (C) tempo; contraste; condição.
- (D) comparação; contraste; fim.
- (E) tempo; conclusão; condição.

09. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de regência verbal e nominal.

- (A) Tudo isso indica que o Brasil se esqueceu dos compromissos firmados com o seu povo, que tem o anseio por uma vida sem pobreza e marginalização.
- (B) Tudo isso indica que o Brasil esqueceu dos compromissos firmados com o seu povo, que tem o desejo por uma vida sem pobreza e marginalização.
- (C) Tudo isso indica que o Brasil esqueceu os compromissos firmados com o seu povo, que tem a aspiração em uma vida sem pobreza e marginalização.
- (D) Tudo isso indica que o Brasil esqueceu dos compromissos firmados com o seu povo, que tem o sonho a uma vida sem pobreza e marginalização.
- (E) Tudo isso indica que o Brasil se esqueceu dos compromissos firmados com o seu povo, que tem a pretensão com uma vida sem pobreza e marginalização.

10. Coube \_\_\_\_ Constituição federal firmar compromissos com o povo, garantindo \_\_\_\_ todos os cidadãos a erradicação da pobreza e da marginalização. Coube \_\_\_\_ ela, também, firmar o compromisso de redução das desigualdades sociais e regionais. Além disso, foi garantida \_\_\_\_ criança prioridade absoluta.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) à ... à ... a ... a
- (B) a ... à ... à ... a
- (C) à ... à ... à ... à
- (D) a ... a ... à ... à
- (E) à ... a ... a ... à

11. Certo dia, em uma classe,  $\frac{3}{4}$  dos alunos chegaram a tempo, a sexta parte deles chegaram atrasados e os demais faltaram. Sabendo que foram 8 os alunos atrasados, é correto afirmar que o número de faltosos é
- (A) 2.  
(B) 3.  
(C) 4.  
(D) 5.  
(E) 6.
12. Em uma casa de repouso para idosos, há um responsável para controlar os horários daqueles que precisam tomar algum remédio com regularidade. Em certo dia, Joel, esse responsável, teve o compromisso de levar remédios para três idosos que precisavam tomar o remédio em intervalos de, respectivamente, 2 horas, 3 horas e 4 horas. Sabendo que às 8 horas Joel levou remédios para os três idosos tomarem, é correto afirmar que, até às 17h30, o número de vezes que Joel precisou levar remédio apenas para um desses idosos é igual a
- (A) 6.  
(B) 5.  
(C) 4.  
(D) 3.  
(E) 2.
13. Rosa precisa distribuir 50 barras de chocolate e 120 barras de cereal na maior quantidade de saquinhos possível, de modo que todos os saquinhos contenham o mesmo número de barras de chocolate e o mesmo número de barras de cereal. Fazendo dessa maneira, cada saquinho vai conter um total de barras igual a
- (A) 5.  
(B) 10.  
(C) 12.  
(D) 15.  
(E) 17.

14. Luciana tem em sua bolsa 20 cédulas de dez reais, e 30 cédulas de 20 reais. Em relação ao total de dinheiro que Luciana tem na bolsa, a quantidade desse dinheiro, em cédulas de dez reais, corresponde a:
- (A) 15%  
(B) 20%  
(C) 25%  
(D) 40%  
(E) 66%
15. Em uma classe com 33 alunos, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é  $\frac{3}{8}$ . No retorno das férias, verificou-se que 6 meninas haviam saído dessa classe. Com essa alteração, a razão entre o número de meninos e o número de meninas passou a ser:
- (A)  $\frac{4}{5}$   
(B)  $\frac{3}{7}$   
(C)  $\frac{1}{2}$   
(D)  $\frac{3}{8}$   
(E)  $\frac{4}{7}$
16. Ao preparar doces para festas infantis, uma doceira sempre usa a razão 90 brigadeiros para cada 15 crianças. Portanto, em uma festa em que são esperadas 125 crianças, essa doceira deve preparar um número de brigadeiros igual a
- (A) 780.  
(B) 750.  
(C) 725.  
(D) 690.  
(E) 675.
17. A área de um retângulo é  $96 \text{ m}^2$ . Sabe-se que a raiz positiva da equação  $x^2 + 4x = 96$  é o valor, em metros, da medida de um dos lados desse retângulo.
- O perímetro desse retângulo é
- (A) 32 m.  
(B) 36 m.  
(C) 38 m.  
(D) 40 m.  
(E) 44 m.

18. Em uma frutaria, paga-se R\$ 22,00 por 1 kg de peras e 1 kg de maçãs; R\$ 34,00 por 2 kg de maçãs e 1 kg de abacates. Sabendo que o 1 kg de maçãs custa R\$ 4,00 a mais do que 1 kg de peras, uma pessoa que comprar 2,5 kg de cada uma dessas frutas pagará a quantia de


(A) R\$ 75,00.  
(B) R\$ 72,50.  
(C) R\$ 70,00.  
(D) R\$ 68,50.  
(E) R\$ 68,00.

19. Um grupo de 7 mágicos planejou apresentar o mesmo espetáculo em 7 salas de uma escola. Inicialmente, as salas estavam ocupadas por, respectivamente, 9, 19, 21, 7, 5, 22 e 15 convidados. Para que cada sala ficasse com o mesmo número de convidados, a organização do espetáculo mudou o menor número possível deles de lugar.

O número de convidados que mudaram de sala foi igual a

(A) 10.  
(B) 14.  
(C) 17.  
(D) 21.  
(E) 23.

20. O desenho a seguir, fora de escala, representa um percurso em formato de um polígono de 5 lados. As indicações numéricas indicam os comprimentos dos segmentos de reta do percurso na unidade quilômetro.



Se uma pessoa der uma volta completa nesse percurso, ela percorrerá a distância de

(A) 54 km.  
(B) 50 km.  
(C) 48 km.  
(D) 47 km.  
(E) 44 km.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), bem como a inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Uma vez comprovada a infração por meio de processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético-Disciplinar vigente, de acordo com sua gravidade, o profissional de enfermagem estará sujeito às penalidades estabelecidas pelo CEPE, entre elas a suspensão, que consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até \_\_\_\_ dias, sendo esta divulgada \_\_\_\_\_. A aplicação dessa penalidade é de responsabilidade do \_\_\_\_\_ e será registrada no prontuário do profissional de enfermagem.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.

- (A) 30 ... no site do Conselho Regional de Enfermagem no qual o profissional está registrado, em jornais locais e redes sociais ... Conselho Regional de Enfermagem
- (B) 90 ... nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e nos jornais de grande circulação, além de comunicada aos órgãos empregadores ... Conselho Regional de Enfermagem
- (C) 180 ... em jornais de grande circulação, além de comunicada aos órgãos empregadores ... Conselho Federal de Enfermagem
- (D) 30 ... nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e nos jornais locais, além de comunicada ao sindicato dos profissionais de enfermagem ... Conselho Regional de Enfermagem
- (E) 90 ... nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e nos jornais de grande circulação, além de comunicada aos órgãos empregadores ... Conselho Federal de Enfermagem

**22.** O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) determina que o Processo de Enfermagem (PE) deve ser realizado em todo contexto socioambiental no qual ocorre o cuidado de enfermagem.

Em conformidade com a legislação do exercício profissional e sob supervisão e orientação do enfermeiro, o auxiliar de enfermagem participa do PE

- (A) realizando as anotações de enfermagem, a implementação dos cuidados de enfermagem prescritos e sua checagem.
- (B) realizando, a partir da avaliação de enfermagem, os diagnósticos de enfermagem para a pessoa, a família, a coletividade e os grupos especiais.
- (C) determinando as metas e os resultados esperados e possíveis de serem obtidos por meio da assistência de enfermagem para a pessoa, a família, a coletividade e os grupos especiais.
- (D) definindo o plano de cuidados de enfermagem a ser implementado para o indivíduo, a família e a comunidade, a partir da priorização dos diagnósticos de enfermagem.
- (E) realizando o julgamento clínico das informações coletadas na etapa de avaliação de enfermagem sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde da pessoa, da família, da coletividade ou dos grupos especiais.

**23.** Para realizar a punção venosa periférica, recomenda-se usar um garrote acima do local da punção para potencializar a distensão venosa. Para evitar interferências nos resultados de exames laboratoriais realizados em amostras de sangue, o auxiliar de enfermagem deve observar que o tempo de uso do garrote não deve exceder

- (A) cinco minutos.
- (B) quatro minutos.
- (C) três minutos.
- (D) dois minutos.
- (E) um minuto.

**24.** Observando o cumprimento de todas as condições para a obtenção de valores fidedignos, ao aferir a pressão arterial (PA) no braço direito de um idoso utilizando um aparelho manual analógico, o auxiliar de enfermagem (AE) auscultou o primeiro som (batimento) quando o ponteiro do dispositivo indicava 138 mmHg, observou o abaixamento do som na marcação de 122 mmHg e constatou que a ausculta dos batimentos persistia até a marcação de 0 (zero) mmHg.

Frente a essa situação hipotética, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, o AE deve anotar corretamente no prontuário do idoso: PA (braço direito) =

- (A) 140/120/zero mmHg.
- (B) 138/122/zero mmHg.
- (C) 14 x 12 mmHg.
- (D) 13,8 x 12,2 mmHg.
- (E) 14/12/zero mmHg.

**25.** Atualmente, considera-se que, ao administrar medicamentos e vacinas injetáveis por via subcutânea em adultos, o volume máximo administrado não deve ultrapassar

- (A) 0,1 mL.
- (B) 0,3 mL.
- (C) 0,4 mL.
- (D) 0,5 mL.
- (E) 1,0 mL.

**26.** Em uma unidade de pronto atendimento (UPA), ao assumir o plantão, o auxiliar de enfermagem foi informado sobre um paciente, com suspeita de influenza, que aguardava remoção para o hospital. Constatou que esse paciente estava isolado em um consultório e que havia orientação para a adoção de precauções para gotículas. De acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, esse tipo de precaução inclui a higienização das mãos \_\_\_\_\_ contato com o paciente, o uso de óculos, avental e máscara \_\_\_\_\_ pelo profissional quando houver risco de contato com sangue ou secreções, o uso de máscara \_\_\_\_\_ pelo paciente durante toda sua permanência fora do quarto, quando necessário seu transporte, e o descarte adequado de materiais perfurocortantes.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.

- (A) antes do ... PFF2 ... PFF2
- (B) antes e após o ... N95 ... cirúrgica
- (C) antes e após o ... cirúrgica ... cirúrgica
- (D) após o ... cirúrgica ... N95
- (E) antes e após o ... N95 ... N95

**27.** Após realizar a avaliação de uma puérpera submetida a cirurgia cesariana há dez dias, o enfermeiro, em consonância com o médico de saúde da família, prescreveu a retirada total dos pontos da sutura do tipo contínua, uma vez que a cicatrização da ferida operatória estava normal, sem sinais sugestivos de infecção.

Ao realizar esse procedimento utilizando um pacote estéril para retirada de pontos, o auxiliar de enfermagem deve, entre outras ações,

- (A) considerar que é desnecessário o uso de técnica asséptica.
- (B) realizar a irrigação da ferida cirúrgica utilizando uma seringa de 20 mL acoplada com agulha calibre 40 x 12, preenchida com soro fisiológico 0,9%.
- (C) realizar a antisepsia da ferida cirúrgica e da pele vizinha com algodão embebido em solução antisséptica iodada, em veículo alcoólico.
- (D) tracionar firmemente, com auxílio da pinça, o nó do fio de sutura no primeiro ponto cirúrgico e, utilizando tesoura, cortar o fio acima e o mais próximo da pele, removendo o ponto.
- (E) realizar novamente a limpeza da incisão e da pele adjacente com gaze estéril embebida em solução antisséptica degermante, após a remoção dos pontos da ferida operatória.

**28.** Em uma unidade básica de saúde (UBS), B.B., 48 anos, do sexo masculino, procurou o acolhimento porque estava com dúvidas a respeito da frequência com que deveria aferir sua pressão arterial (PA) para a realização da medição residencial da pressão arterial (MRPA), solicitada pelo médico para investigar a suspeita de hipertensão mascarada.

Durante o atendimento do usuário, o auxiliar de enfermagem deve esclarecer que, de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde, deve(m) ser realizada(s)

- (A) três aferições pela manhã, antes do desjejum e da tomada da medicação, e três à noite, antes do jantar, durante cinco dias.
- (B) uma aferição pela manhã, imediatamente após se levantar, uma após o almoço e uma antes de se deitar, durante sete dias.
- (C) duas aferições pela manhã, uma antes do desjejum e da tomada da medicação e outra após ingerir a medicação; uma à tarde, após o almoço; e duas à noite, trinta minutos após o jantar, durante cinco dias.
- (D) três aferições pela manhã, trinta minutos após o desjejum e da tomada da medicação, e três à noite, trinta minutos após o jantar, durante três dias.
- (E) duas aferições pela manhã, antes do desjejum e da tomada da medicação, e duas à noite, antes do jantar, durante três dias.

29. Em uma unidade básica de saúde (UBS), o auxiliar de enfermagem participa de grupos de educação em saúde para diabéticos e cuidadores. Nessas oportunidades, deve reforçar as orientações para o autocuidado dos pés recomendadas pelo Ministério da Saúde, tal como
- (A) realizar a inspeção dos pés a cada trinta dias, pelo próprio diabético ou com a ajuda de um familiar ou um cuidador orientado.
  - (B) dar preferência ao uso de meias altas, acima dos joelhos, e não usar meias folgadas.
  - (C) usar, de preferência, meias sem costura ou meias com costura de dentro para o lado de fora.
  - (D) aplicar nos pés cremes ou óleos hidratantes para pele seca, não esquecendo de aplicá-los no espaço entre os dedos.
  - (E) utilizar agentes químicos ou emplastros vendidos em farmácias, em vez de lâminas, para a remoção de calos.
30. Segundo o Ministério da Saúde, as quedas constituem um sério problema para as pessoas idosas e estão relacionadas a elevados índices de morbimortalidade, redução da capacidade funcional e institucionalização precoce. Assim sendo, as pessoas idosas, seus familiares e cuidadores devem ser orientados quanto à adoção de medidas de prevenção, como
- (A) dar preferência aos banhos em banheira, com água morna.
  - (B) instalar corrimão para apoio em apenas um lado da escada, evitando diminuir a sua largura.
  - (C) colocar um tapete colorido no início e no fim da escada, facilitando a identificação do primeiro e do último degraus.
  - (D) instalar iluminação frontal nas escadas para facilitar a identificação dos degraus.
  - (E) acomodar gêneros alimentícios em locais de fácil acesso, evitando a necessidade de uso de escadas e banquinhos.
31. Considere o estabelecido pelo Estatuto da Pessoa Idosa e assinale a alternativa correta.
- (A) Entre as pessoas idosas, em todo atendimento de saúde, os maiores de 70 (setenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
  - (B) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo critério médico.
  - (C) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas e identificados por profissionais de enfermagem serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como à autoridade policial e ao Conselho Regional de Enfermagem.
  - (D) A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de atendimento domiciliar, excluindo-se o regime de internação domiciliar, para a população que desse atendimento necessitar e esteja impossibilitada de se locomover.
  - (E) Os serviços públicos de saúde devem garantir a cota de 20% das consultas agendadas para as pessoas idosas, podendo as vagas serem preenchidas por usuários com menos de 60 (sessenta) anos caso não haja procura pelo grupo a que se destinam prioritariamente.

**32.** O tratamento diretamente observado (TDO) é uma das estratégias adotadas para melhorar a adesão do paciente ao tratamento da tuberculose (TB). Para o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) considerar o tratamento como TDO, a ingestão dos medicamentos pela pessoa em tratamento da TB deve ser realizada sob a observação direta de \_\_\_\_\_. O TDO deve ser realizado, de preferência, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. O local e o horário devem ser \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente a afirmação.

- (A) um familiar ou de um amigo ... diariamente ... em todo o tratamento ... acordados entre o paciente e a família ou o amigo
- (B) um profissional de saúde ou de um familiar ... em dias alternados ... nos primeiros dois meses de tratamento ... determinados pelo paciente, conforme sua disponibilidade
- (C) uma pessoa que more junto com o doente ou de um cuidador ... três vezes por semana ... em todo o tratamento ... definidos pela pessoa que supervisionará a ingestão dos medicamentos, conforme sua disponibilidade
- (D) um profissional de saúde ou de outros profissionais capacitados, quando supervisionados por profissionais de saúde ... diariamente, de segunda a sexta-feira ... em todo o tratamento ... acordados entre o paciente e a equipe de saúde
- (E) um assistente social capacitado para tal ou de um familiar ... diariamente, de segunda a sexta-feira ... em todo o tratamento ... determinados pelo paciente, conforme sua disponibilidade

**33.** Em uma unidade básica de saúde (UBS), o auxiliar de enfermagem tem, como uma de suas atribuições, a coleta de amostra de sangue para realização do exame do pezinho. Para executar esse procedimento, ele deve lavar as mãos, calçar as luvas de procedimento e, entre outras ações,

- (A) solicitar à mãe ou ao acompanhante da criança que fique em pé, segurando a criança com a cabeça encostada no seu ombro, de modo que o calcanhar dela esteja sempre abaixo do nível do coração.
- (B) realizar a antisepsia do calcanhar do bebê com algodão/SWAB umedecido em clorexidina e aguardar que a substância seque.
- (C) aplicar compressa fria, por cinco minutos, no calcanhar escolhido para punção, com a finalidade de reduzir a dor e a movimentação da criança, facilitando a coleta.
- (D) realizar a punção da face lateral do calcanhar do bebê, utilizando, preferencialmente, agulha hipodérmica de calibre 13 x 0,3.
- (E) realizar a “ordenha” do calcanhar puncionado para obter um sangramento abundante, enquanto encosta o papel-filtro no sangramento fazendo movimentos circulares, impedindo que o sangue coagule no calcanhar.

**34.** No que diz respeito à amamentação como medida para redução da dor durante a administração de vacinas injetáveis em crianças em aleitamento materno, o Ministério da Saúde orienta que,

- (A) se houver vacinas orais e injetáveis a serem administradas na mesma oportunidade, a mãe deve iniciar a amamentação; em seguida, deve-se realizar a administração das vacinas injetáveis e, somente quinze minutos após finalizada a amamentação, deve-se administrar a vacina oral.
- (B) após a administração de todas as vacinas que a criança deverá receber naquela oportunidade, a amamentação poderá ser iniciada, e essa informação deve ser passada às mães.
- (C) se houver vacinas orais e injetáveis a serem administradas na mesma oportunidade, a amamentação está contraindicada, pois aumenta a chance de a criança regurgitar ou vomitar a vacina oral.
- (D) se houver vacinas orais e injetáveis a serem administradas na mesma oportunidade, deve-se administrar primeiro a vacina oral e, a seguir, proceder a amamentação para que seja realizada a administração das vacinas injetáveis.
- (E) por não existirem evidências científicas de que a amamentação promova a redução da dor durante a administração de vacinas injetáveis em crianças em aleitamento materno, trata-se de um mito.

**35.** Acompanhada de sua filha com 1 ano e 3 meses de idade, A.A. compareceu à unidade básica de saúde (UBS) para vacinar a criança. Ao analisar os registros presentes na carteira de vacinas, o auxiliar de enfermagem constatou que o esquema vacinal da criança, aplicado nas idades recomendadas, estava completo e correto.

Assim sendo, de acordo com o estabelecido pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), o profissional deve administrar à referida criança

- (A) a vacina Difteria, Tétano e Coqueluche (DPT), a dose de reforço da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) e as vacinas Hepatite A e Tetraviral (dose única).
- (B) a vacina Difteria, Tétano e Coqueluche (DPT), a dose de reforço da Vacina Oral contra a Poliomielite (VOP) e as vacinas Hepatite B e Tríplice (dose única).
- (C) a dose de reforço da vacina Pneumocócica 10-valente e Meningo C (conjugada) e a primeira dose da vacina tríplice viral.
- (D) a dose de reforço da vacina Pentavalente e as vacinas Hepatite A e Tetraviral (dose única).
- (E) a terceira dose da vacina contra covid-19, a dose de reforço da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) e a primeira dose da vacina contra febre amarela.

**36.** Após receber a notificação de um caso suspeito de sarampo em uma escola, a equipe de saúde da família responsável pela área foi solicitada a operacionalizar a vacinação de bloqueio dos comunicantes, e o auxiliar de enfermagem (AE) foi incumbido de organizar as caixas térmicas para o transporte das vacinas que serão aplicadas na escola.

Para tal, entre outras ações, o AE deve

- (A) higienizar a parte interna da caixa térmica com compressas embebidas com álcool 70%.
- (B) dar preferência ao uso de gelo em escamas para a conservação das vacinas, pois ele se acomoda melhor preenchendo todos os espaços no interior da caixa térmica contendo as vacinas.
- (C) dispor as bobinas reutilizáveis congeladas ou uma camada de gelo em escamas no fundo da caixa térmica, sobre estas, as vacinas e, por último, uma camada de bobinas reutilizáveis congeladas ou de gelo em escamas.
- (D) posicionar o registrador de temperatura do termômetro no centro da carga, após organizar as vacinas no interior da caixa, para garantir a medição de temperatura precisa dos imunobiológicos, que deve ficar entre +2 e +8 °C.
- (E) higienizar novamente as caixas térmicas, após o uso, e guardá-las fechadas, para evitar contaminação interna.

**37.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente doenças e/ou agravos e/ou eventos de saúde pública que devem ser notificados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em até 24 horas.

- (A) Violência doméstica, rubéola e óbito infantil.
- (B) Dermatose ocupacional, perda auditiva relacionada ao trabalho e câncer ocupacional.
- (C) Leptospirose, tétano acidental e acidente por animal peçonhento.
- (D) Toxoplasmose gestacional, sífilis e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana.
- (E) Acidente de trabalho com exposição a material biológico, casos de dengue e hanseníase.

**38.** Em uma unidade de pronto atendimento (UPA), utiliza-se solução de hipoclorito de sódio a 1% para a desinfecção de máscaras para inalação.

Para garantir a segurança e a eficácia desse procedimento, o auxiliar de enfermagem deve, entre outras ações,

- (A) preparar e manter a solução em recipiente opaco, não metálico, com tampa e de uso exclusivo, identificado com o tipo de solução, as datas e os horários de seu preparo, a validade e a identificação de quem a preparou.
- (B) mergulhar as máscaras na solução desinfetante por cinco minutos, imediatamente após o uso, retirá-las, lavá-las com água e sabão, secá-las e guardá-las em recipiente plástico com tampa.
- (C) após higienizar as máscaras com água e detergente, mantê-las totalmente mergulhadas na solução desinfetante por dez minutos, para obter desinfecção de alto nível.
- (D) retirar as máscaras da solução desinfetante decorrido o tempo necessário para a desinfecção, enxaguá-las abundantemente com soro fisiológico 0,9% até a retirada total do agente desinfetante, e deixá-las secar naturalmente, sobre compressas ou tecido limpo.
- (E) trocar a solução a cada sete dias a contar do início do seu uso; se o uso for intenso, desprezar a solução a cada 24-48 horas ou na presença de matéria orgânica dissolvida no desinfetante.

**39.** Enquanto aguardava atendimento, uma gestante com 32 semanas de gestação apresentou perda da consciência, evoluindo rapidamente para parada cardiorrespiratória. Antes de serem iniciados os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, a gestante deve ser

- (A) posicionada em decúbito lateral direito.
- (B) colocada em posição supina.
- (C) colocada em posição de Fowler.
- (D) colocada em posição prona.
- (E) colocada em posição de Trendelenburg.

**40.** No que diz respeito à busca ativa de casos de tuberculose, ao prestar cuidados de enfermagem, o auxiliar de enfermagem deve estar atento ao sintomático respiratório, que, na população geral, caracteriza-se pela queixa de tosse

- (A) com qualquer tempo de duração.
- (B) por sete dias, acompanhada de febre contínua acima de 38 °C.
- (C) seca, por sete dias, acompanhada de febre contínua acima de 38 °C.
- (D) produtiva, por dez dias.
- (E) por três semanas ou mais.





