



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 005/2019

MÉDICO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

VERSÃO
A

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **08 (oito) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **40 (quarenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 5 (cinco) questões, História e Geografia do Acre 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. Os candidatos poderão levar seu Caderno de Questões somente após transcorridas **04 (quatro) horas** do início das provas.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia com atenção a tira de “Hagar, o Horrível”, criada pelo cartunista Dik Browne, para responder às questões 1 e 2 a seguir.



1) Considere o sentido da tira e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- a) A ameaça feita no primeiro quadrinho é estruturada linguisticamente com a utilização de uma Oração Coordenada Alternativa, assim como a resposta dada a essa ameaça.
- b) É possível deduzir o gênero da personagem que enuncia a fala no segundo quadrinho, principalmente, pela Oração Subordinada Adverbial Temporal utilizada por Hagar no terceiro quadrinho.
- c) O humor da tira é construído por meio do equívoco de Hagar que diz “homem da casa”, ao invés de dizer “homem do castelo”.
- d) A tira não compactua com a visão patriarcal de que as mulheres não podem se impor socialmente.

2) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A partícula “se” no primeiro quadrinho é um pronome reflexivo.
 - II. A expressão “o horrível” no primeiro quadrinho tem função sintática de aposto.
 - III. Os verbos, no terceiro quadrinho, estão conjugados, predominantemente, no presente do indicativo.
 - IV. A expressão “rapazes”, no terceiro quadrinho, desempenha a função de sujeito do verbo “Ir”, conjugado na primeira pessoa do plural.
- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
 - c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Leia com atenção trecho do texto “O que é algoritmo?” de Ana Paula Pereira (TecMundo) para responder às questões 3, 4 e 5 a seguir.

(adaptado)

Nos dias atuais e com a evolução galopante da tecnologia, dificilmente encontramos pessoas que nunca tenham utilizado um computador. Os propósitos podem variar bastante, seja para edição de textos, jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil de imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta.

Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, você algum dia deve ter parado para pensar como os programas funcionam. Você deve ter feito a si mesmo esta pergunta: como é que o computador faz todas as tarefas exatamente da forma que você pede? A resposta é mais simples do que parece: ele segue as instruções que você passa.

Mas, para que ele consiga entender o que você fala, ele precisa de uma linguagem mais específica. Para fazer essa interpretação entre homem e máquina, foram desenvolvidas as linguagens de programação. Para que essa interação seja possível, eles são fundamentais: os algoritmos.

Um algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa, como a receita de um bolo. Ele não responde à pergunta “o que fazer?”, mas sim “como fazer”. Em termos mais técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa. Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma intuitiva e automática diariamente quando executa tarefas comuns. Como estas atividades são simples e dispensam ficar pensando nas instruções necessárias para fazê-las, o algoritmo presente nelas acaba passando despercebido.

3) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- a) A oração destacada no trecho “**Embora você não perceba**, utiliza algoritmos de forma intuitiva e automática diariamente” é classificada sintaticamente como uma Oração Coordenada Adversativa.
- b) A oração destacada no trecho “ele consiga entender o **que você fala**” é classificada sintaticamente como Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.
- c) O termo destacado no trecho “utiliza algoritmos **de forma intuitiva**” é classificado sintaticamente como Adjunto Adverbial de modo.
- d) O termo destacado no trecho “Os propósitos podem variar **bastante**” é classificado sintaticamente como Adjunto Adverbial de intensidade.

4) Considerando o texto, os elementos de coesão referencial e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () No trecho “**Nessa** atividade tão comum ao nosso cotidiano”, o termo destacado “nessa” é a contração da preposição “em” e do pronome demonstrativo “essa”, que funciona como um recurso anafórico por fazer referência a algo já mencionado no texto.
- () No trecho “Você deve ter feito a si mesmo **esta** pergunta”, o termo destacado “esta” funciona como elemento catafórico de coesão, já que se refere a uma expressão enunciada posteriormente a ele no texto.
- () No trecho “**que** devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa.”, a palavra “que” é um pronome relativo que retoma anaforicamente a expressão “sequência lógica”.
- () No trecho “Para realizar essa interação, **eles** são fundamentais: os algoritmos.”, o termo destacado “eles” é um pronome pessoal que possui no texto função anafórica, já que tem função de retomar um referente mencionado.
- () No trecho “nas instruções necessárias para fazê-**las**” o termo destacado “las” é um pronome pessoal que possui função catafórica, já que se refere a um termo utilizado depois dele no texto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, F, V.
- b) F, V, V, V, F.
- c) F, V, F, V, V.
- d) V, V, F, F, F.

5) De acordo com o texto e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.

- a) Segundo o texto, graças ao desenvolvimento tecnológico, o uso do computador está amplamente difundido na sociedade e atende a atividades de diferentes graus de complexidade, o que torna plausível a vida sem esse recurso tecnológico.
- b) A expressão “nada mais”, no trecho “algoritmo nada mais é do que uma receita”, é uma forma pejorativa de caracterizar os algoritmos dada sua vasta utilização na sociedade contemporânea.
- c) Para explicar o conceito de “algoritmo”, a autora utiliza como estratégia didática uma linguagem figurada antes de fazer uma definição mais técnica.
- d) De acordo com o texto, algumas atividades cotidianas, por serem tão fáceis e automatizadas, dispensam o uso, mesmo inconsciente, dos algoritmos para serem realizadas.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

6) Em relação à história e formação do território do estado do Acre, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Acre foi anexado ao Brasil em 1903, por meio do Tratado de Petrópolis.
- () O território do Acre foi elevado à categoria de estado no ano de 1962.
- () O Acre foi o último estado criado no território brasileiro, em 1988.
- () No período colonial, o Acre pertencia à Bolívia e à Colômbia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, V
- b) V, V, F, F
- c) F, V, V, F
- d) F, F, F, V

7) “De 1877 até 1911, houve um aumento considerável na produção da borracha que, devido às primitivas técnicas de extração empregada, estava associado ao aumento do emprego de mão-de-obra. A borracha chegou a representar 25% da exportação do Brasil”.

(Portal São Francisco, 2019)

Quanto ao produto do extrativismo vegetal que se relaciona ao texto, assinale a alternativa correta.

- a) Pau-brasil
- b) Carvão vegetal
- c) Látex
- d) Pinhão

8) No que diz respeito à economia do estado do Acre, assinale a alternativa correta.

- a) O Produto Interno Bruto (PIB) do Acre está entre os dez maiores do Brasil
- b) O Índice De Desenvolvimento Humano (IDH) do Acre é o menor entre os estados brasileiros
- c) O setor de maior participação na economia do estado é o secundário (indústrias)
- d) O Acre é um dos maiores produtores de borracha do país

9) No que se refere aos aspectos populacionais do estado do Acre, conforme o Censo Demográfico de 2010, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A população do estado ultrapassa os dois milhões de habitantes
- b) A população urbana do estado é superior à população rural
- c) A cidade mais populosa do estado é Rio Branco
- d) A cidade menos populosa do estado é Santa Rosa do Perus

10) A respeito de um domínio morfoclimático localizado no estado do Acre, assinale a alternativa correta.

- a) Amazônico
- b) Cerrados
- c) Mata Atlântica
- d) Mares de morros

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Sobre a estenose aórtica no idoso, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () É a valvopatia mais frequente em idosos.
- () A radiografia de tórax pode apresentar-se normal, em cerca de metade dos idosos examinados.
- () O *ictus cordis* do tipo impulsivo, em idosos, pode estar ausente em virtude do aumento do diâmetro anteroposterior da caixa torácica.
- () O paciente pode ser assintomático ou apresentar-se com dispneia, angina de peito ou síncope.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) V, V, F, F
- c) V, F, F, V
- d) F, F, V, V

12) Sobre a Insuficiência Cardíaca (IC) no idoso, assinale a alternativa incorreta.

- a) Pacientes idosos podem ter apresentações atípicas da IC devido a alterações cognitivas, sedentarismo, limitações funcionais e presença de comorbidades
- b) O resultado de um eletrocardiograma normal não é útil para tornar a hipótese de IC menos provável
- c) A amiloidose senil, hoje, é uma condição crescente nos indivíduos acima dos 70 anos de idade, sendo uma das causas de IC no idoso
- d) Recomenda-se o uso de um inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) em conjunto a betabloqueador com objetivo de redução de mortalidade e hospitalização

13) Sobre a Doença Arterial Coronariana Crônica (DAC) no idoso, assinale a alternativa incorreta.

- a) A apresentação de isquemia frequentemente acontece sob forma de equivalentes anginosos: fadiga, dispneia, desconforto epigástrico, sendo incomum a presença de angina típica
- b) O eletrocardiograma de repouso pode ser inespecífico em 50% dos casos, mesmo na vigência de coronariopatia grave
- c) Inflamação determinada por infecções desempenha um reconhecido papel no surgimento de complicações em doença coronariana, e vacinação contra influenza e pneumococos é medida recomendável no idoso coronariopata
- d) As medicações antiateroscleróticas como as estatinas não têm demonstração confirmada, em ensaios, em pacientes com mais de 70 anos de idade. Em pacientes com idade < 70 anos devem ser estimuladas a atingir metas de LDL-colesterol de < 70 mg/dl

14) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é o principal fator de risco cardiovascular encontrado em idosos no Brasil. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Estudo epidemiológico brasileiro mostrou que a HAS se encontra presente em 65% dos idosos ambulatoriais e em 80% das mulheres > 75 anos de idade.
- II. A pseudo-hipertensão pode surgir em idosos com arteriosclerose pronunciada. Pode-se suspeitar de pseudo-hipertensão arterial quando a pressão arterial (PA) sistólica está elevada, porém o paciente não apresenta lesão em órgãos-alvo, ou diante de manifestações de hipotensão após tratamento com anti-hipertensivos em dose baixa.
- III. Pressão de Pulso (PP) é definida como a diferença entre a PA sistólica e a PA diastólica. Isto ocorre pela progressiva perda de elasticidade arterial, com consequente redução da complacência vascular. A PAD tende a ficar normal ou até baixa. Não se demonstrou maior risco cardiovascular associado a maior PP, em pacientes de 70 a 79 anos de idade.

- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa III está correta

15) SAS, 52 anos, teve diagnóstico confirmado de diabetes mellitus por duas medidas de glicemia de jejum e de Hipertensão Arterial (HAS) por monitorização ambulatorial da Pressão Arterial (PA), que mostrou médias de PA de 24 horas de 132/82 mmHg, em vigília de 136/86 mmHg e sono de 122/74 mmHg. Sobre o tratamento da HAS desse paciente, assinale a alternativa correta.

- a) A meta de PA a ser atingida é < 130/80 mmHg, devendo-se iniciar tratamento farmacológico de imediato em monoterapia e em dose habitual
- b) A meta de PA a ser atingida é < 140/90 mmHg, devendo-se iniciar tratamento farmacológico ao diagnóstico, com associação de dois anti-hipertensivos, ambos em doses baixas
- c) A meta de PA a ser atingida é < 130/80 mmHg, devendo-se iniciar tratamento farmacológico, ao diagnóstico, com associação de dois anti-hipertensivos, ambos em doses baixas
- d) A meta de PA a ser atingida é < 140/90 mmHg, devendo-se iniciar tratamento com medidas não farmacológicas apenas e reavaliar após seis meses

16) MCPL, 62 anos de idade, realizou medida de glicose plasmática, após 10 horas de jejum. O resultado mostrou concentração de glicose de 126 mg/dl, sendo repetido na mesma amostra com resultado de 127 mg/dl. A paciente tem mãe diabética e nunca tinha realizado exames para detecção de diabetes. Sobre o caso, considere as mais recentes diretrizes da *American Diabetes Association* e assinale a alternativa correta.

- a) O diagnóstico de diabetes só poderá ser confirmado após repetição do exame em uma segunda amostra em dia diferente
- b) A paciente preenche os critérios para diagnóstico de pré-diabetes
- c) A paciente pode ser considerada diabética
- d) A paciente tem indicação precisa para teste oral de tolerância à glicose

17) Acerca dos alvos para controle glicêmico em pacientes diabéticos, pela hemoglobina glicada (A1C), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Para pacientes adultos com diabetes de início recente, aderentes ao tratamento e sem comorbidades, é recomendado o alvo < 6%.
 - II. Para pacientes adultos com múltiplas comorbidades, o alvo recomendado é < 6,5%.
 - III. Para a maior parte dos pacientes adultos fora do período gestacional, o alvo < 7% pode ser considerado.
- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
 - c) As afirmativas I, II e III estão corretas
 - d) Apenas a afirmativa III está correta

18) A metformina é um hipoglicemiante oral amplamente utilizado no tratamento farmacológico do diabetes mellitus tipo 2. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O uso prolongado de metformina pode estar associado à deficiência bioquímica de vitamina B1.
 - II. A metformina é o agente farmacológico inicial preferencial para o tratamento do diabetes tipo 2.
 - III. Uma vez iniciada, a metformina deve ser continuada desde que seja tolerada e não contraindicada; outros agentes, exceto a insulina, podem ser adicionados à metformina.
 - IV. A terapêutica com metformina para prevenção da diabetes tipo 2 deve ser considerada em indivíduos com pré-diabetes, especialmente para aqueles com IMC ≥ 35 kg/m², aqueles com idade < 60 anos, e mulheres com diabetes mellitus gestacional prévio.
- a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas

19) Paciente feminina de 61 anos de idade, hipertensa há mais de 20 anos, apresenta em exames realizados, quatro semanas antes da consulta, creatinina sérica de 1,4 mg/dl, filtração glomerular estimada pela fórmula CKD EPI de 55 ml/min e albuminúria de 45 mg/g. Exames realizados quatro meses antes dessa consulta mostravam: creatinina sérica de 1,3 mg/dl, filtração glomerular estimada pela fórmula CKD EPI de 59 ml/min e albuminúria de 31 mg/g. A paciente faz uso de anlodipino em monoterapia e apresenta pressão arterial de consultório entre 138 x 82 e 140 x 85 mmHg. Considerando a classificação atual da doença renal crônica, o estadiamento desse paciente seria _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) G3a A1
- b) G2 A2
- c) G2 A1
- d) G3a A2

20) Um estudante universitário de 26 anos de idade, masculino, apresenta quadro clínico e radiológico compatível com pneumonia lobar à D. É solteiro, vive com os pais e tem boas condições domiciliares. Ao exame físico está consciente e orientado, apresenta pressão arterial de 110 x 72 mmHg, frequência respiratória de 26 mrpm, frequência de pulso de 96 bpm, temperatura de 37,4°C. Os exames de laboratório mostram hemograma com leucocitose moderada e desvio à esquerda, ureia de 35mg/dl, creatinina de 1,1 mg/dl, glicemia de 94 mg/dl e os demais dentro da faixa de normalidade. O paciente não apresenta histórico de alergia a nenhum medicamento e não fez uso de antibióticos há pelo menos 1 ano. Considere as recomendações brasileiras, acerca das possíveis condutas para terapia antimicrobiana neste caso e assinale a alternativa correta.

- a) Amoxicilina + ácido clavulânico por via oral, em regime ambulatorial
- b) Azitromicina via venosa, inicialmente em regime de internação
- c) Claritromicina, via venosa, inicialmente em regime de internação
- d) Cefuroxima por via oral, em regime ambulatorial

21) Sobre o tratamento das pneumonias adquiridas na comunidade, segundo as recomendações brasileiras, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Para os pacientes ambulatoriais, sem comorbidades, nenhum uso recente de antibióticos, sem fatores de risco para resistência e sem contraindicação ou história de alergia a betalactâmicos e macrolídeos, sugere-se evitar o uso das fluoroquinolonas devido ao recente alerta da agência norte-americana *Food and Drug Administration* sobre o potencial risco de efeitos colaterais graves.
- () Em nosso meio, os dados mais recentes apontam que a resistência à penicilina do pneumococo deve ser uma preocupação mesmo para os casos menos graves de PAC
- () A cobertura antibiótica para patógenos atípicos nos casos de PAC de menor gravidade ainda é controversa, e vários estudos não mostraram vantagens com essa conduta.
- () Os riscos de infecção por agentes patogênicos resistentes e de falência terapêutica são maiores quando há história de uso de um antibiótico nos três meses anteriores.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, V
- b) V, F, V, V
- c) F, V, V, F
- d) F, F, V, V

22) Acerca dos critérios para se estabelecer o diagnóstico de injúria renal aguda, assinale a alternativa incorreta.

- a) Aumento da concentração sérica de creatinina $\geq 0,3$ mg/dl dentro de 48 horas
- b) Aumento da concentração de creatinina sérica para $\geq 1,5$ vezes o valor basal, que sabidamente ou presumivelmente ocorreu dentro dos 7 dias anteriores
- c) Volume urinário $< 0,5$ ml/kg/h por 6 horas
- d) Aumento da concentração sérica de ureia ≥ 20 mg/dl dentro de 36 horas

23) A síndrome nefrótica afeta 1–3 de 100.000 crianças com menos de 16 anos de idade. Sobre essa síndrome, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. 80% das crianças respondem à corticoterapia.
- II. O diagnóstico por biópsia renal não é mandatório rotineiramente à apresentação clínica.
- III. Sem tratamento, a síndrome nefrótica em crianças está associada a alto risco de morte, particularmente por infecção bacteriana.

- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa III está correta

24) A ivermectina está indicada para o tratamento de parasitoses intestinais. Considere as indicações desse medicamento nesses casos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Estrongiloidíase.
- () Ascaridíase.
- () Giardíase.
- () Teníase

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) V, V, F, F
- c) V, F, F, V
- d) F, F, V, V

25) Acerca da hepatite C, assinale a alternativa incorreta.

- a) Nos pacientes sintomáticos, os sintomas da infecção aguda costumam ocorrer entre 2 e 4 semanas após a exposição ao vírus da hepatite C (HCV)
- b) O anti-HCV é um marcador que indica contato prévio com o vírus. Isoladamente, um resultado reagente para o anticorpo não permite diferenciar uma infecção resolvida naturalmente de uma infecção ativa
- c) Os sintomas da infecção pelo HCV estão presentes na minoria de casos (20% a 30%) e geralmente são inespecíficos, tais como anorexia, astenia, mal-estar e dor abdominal
- d) Casos de insuficiência hepática ou casos fulminantes são extremamente raros

26) Acerca do diagnóstico sorológico da hepatite C, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O RNA do vírus da hepatite C (HCV) pode ser identificado no soro ou plasma antes da presença do anti-HCV.
- II. É um critério para definição de hepatite C aguda a soroconversão recente (há menos de seis meses) e com documentação de anti-HCV não reagente no início dos sintomas ou no momento da exposição, e anti-HCV reagente na segunda dosagem, realizada com intervalo de 90 dias.
- III. É um critério para definição de hepatite C a presença de anti-HCV não reagente e detecção do HCV-RNA em até 90 dias após o início dos sintomas ou a partir da data de exposição, quando esta for conhecida.

- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas a afirmativa III está correta
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas

27) Sobre o tratamento farmacológico da DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), assinale a alternativa correta.

- a) Em pacientes com baixo risco de exacerbação da DPOC e pouco sintomáticos, caso decidido introduzir um tratamento sintomático, pode-se iniciar apenas o uso de um broncodilatador inalatório de longa duração, não havendo preferência de classe na escolha
- b) Os broncodilatadores de curta duração são mais eficazes do que os de longa duração e devem ser priorizados no tratamento dos pacientes com sintomas persistentes
- c) Não há evidências que a antibioticoterapia profilática reduz a incidência de exacerbações da DPOC
- d) Exacerbadores pouco sintomáticos e sem limitação funcional grave podem ser tratados, inicialmente, apenas com corticoide inalatório

28) Entre as manifestações clínicas do tromboembolismo pulmonar, assinale a alternativa correta que contém a menos frequente.

- a) Taquipneia
- b) Dispneia
- c) Tosse
- d) Dor pleurítica

29) Pacientes com enxaqueca não apresentam contra-indicações relativas ou absolutas para a contracepção por meio de _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) DIU (Dispositivo Intrauterino)
- b) Contraceptivos Hormonais Combinados
- c) SIU (Sistema Intrauterino de Levonorgestrel)
- d) Contraceptivo Hormonal só de progesterona

30) Sobre a abordagem clínica nas exacerbações da asma, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os corticosteroides sistêmicos aceleram a melhora das exacerbações e reduzem recidivas, devendo ser utilizados preferencialmente na primeira hora da apresentação clínica. Em casos leves a moderados a via oral é a opção preferencial
- b) A epinefrina intramuscular (adrenalina) é indicada, além da terapia padrão, para a asma aguda associada à anafilaxia e angioedema. Não é rotineiramente indicada para outras exacerbações da asma
- c) A aminofilina e a teofilina intravenosa não devem ser utilizadas nas exacerbações da asma, tendo em vista a sua pouca eficácia e perfil de segurança
- d) A radiografia de tórax é recomendada rotineiramente

31) Recentemente foram publicadas as diretrizes da GINA (*Global Initiative for Asthma*) para manejo e prevenção da asma. Considere essas diretrizes, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O tratamento com baixa dose diária regular de Corticoide Inalatório (CI) é altamente eficaz na redução dos sintomas de asma e na redução do risco de exacerbações relacionadas à asma, hospitalização e morte.
- II. Em adultos e adolescentes com asma leve, o tratamento com CI-formoterol de baixa dose, quando necessário reduz o risco de exacerbações graves em cerca de dois terços em comparação com o tratamento somente beta-agonista de curta duração.
- III. Não se recomenda mais o tratamento da asma em adultos e adolescentes somente com beta-agonista de curta duração.

- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa III está correta

32) Os macrolídeos são um grupo de antimicrobianos quimicamente constituídos por um anel macrocíclico de lactona, ao qual ligam-se um ou mais açúcares. Pertencem a este grupo azitromicina, claritromicina, eritromicina, espiramicina e outros. Considere as características desses antimicrobianos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A claritromicina é altamente ativa contra bactérias gram-positivas, sendo 2 a 4 vezes mais ativa do que a eritromicina contra a maioria dos estreptococos e estafilococos sensíveis à oxacilina.
- () A atividade da claritromicina contra as bactérias gram-negativas é semelhante à da eritromicina, embora um pouco menos ativa contra a *M. catarrhalis*.
- () A azitromicina difere da eritromicina e da claritromicina por ter menor atividade contra bactérias gram-negativas, em particular *H. influenzae*.
- () A azitromicina e a claritromicina apresentam menos intolerância gástrica do que a eritromicina e têm uma meia-vida maior, permitindo que sejam utilizadas em intervalos maiores.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) V, V, F, F
- c) F, F, V, V
- d) V, F, F, V

33) Sobre a febre maculosa brasileira, assinale a alternativa incorreta.

- a) A doxiciclina não é recomendada como opção terapêutica
- b) Em geral, entre o segundo e o sexto dia da doença, surge o exantema maculopapular, predominantemente nas regiões palmar e plantar, que pode evoluir para petéquias, equimoses e hemorragias
- c) Cerca de 80% dos casos, se não diagnosticados e tratados a tempo, evoluem para óbito
- d) É, geralmente, adquirida pela picada de carrapato infectado e a transmissão ocorre quando o artrópode permanece aderido ao hospedeiro por, no mínimo, de 4 a 6 horas. A doença não se transmite de pessoa a pessoa

34) Medicamentos alternativos para o tratamento da sífilis apresentam menor eficácia que a penicilina e só devem ser utilizados em não-gestantes, quando houver histórico de alergia à penicilina ou, mais recentemente, na desta, exigindo assim maior vigilância. Assinale a alternativa correta que contém os antimicrobianos que podem ser indicados, nesses casos.

- a) Ceftriaxona e doxiciclina
- b) Ceftriaxona e cloranfenicol
- c) Doxiciclina e cloranfenicol
- d) Ampicilina e doxiciclina

35) Considere os achados endoscópicos em pacientes dispepticos e assinale a alternativa correta.

- a) Doença do refluxo gastroesofágico é prevalente em cerca de 40% dos casos
- b) Quadro de origem funcional é o mais prevalente
- c) Úlcera péptica é o achado em cerca de 1/3 dos casos
- d) A presença de doença maligna tem prevalência entre 5 e 10%

36) O esomeprazol magnésio é indicado para o tratamento de doenças ácido-pépticas e alívio dos sintomas de azia, regurgitação ácida e dor epigástrica. Sobre esse medicamento, assinale a alternativa incorreta.

- a) Para o tratamento da esofagite de refluxo erosiva, recomenda-se a dose de 40mg uma vez ao dia por 4 semanas. Um tratamento adicional de 4 semanas é recomendado para pacientes com esofagite não cicatrizada ou que apresentam sintomas persistentes
- b) Para o tratamento da úlcera duodenal associada ao *Helicobacter pylori* recomenda-se: 20mg de esomeprazol magnésio com 1g de amoxicilina e 500mg de claritromicina, todos duas vezes ao dia, por 7 dias
- c) Dor de cabeça, dor na barriga, diarreia, gases, enjoo, vômito e prisão de ventre são efeitos colaterais raros
- d) Não é necessário ajuste de dose para os pacientes com insuficiência renal

37) Considere os exames complementares de uso corriqueiro na prática clínica diária. Há um exame que não faz parte da avaliação laboratorial rotineira, recomendada pela Diretriz Brasileira de Hipertensão, seguindo-se ao diagnóstico de hipertensão arterial. Sobre este exame, assinale a alternativa correta.

- a) Análise de urina (exame de urina tipo I)
- b) Potássio plasmático
- c) Ritmo de filtração glomerular estimado
- d) Ureia plasmática

38) As alterações morfológicas de eritrócitos são relacionadas às principais causas de anemias. A presença de micrócitos hipocrômicos indicam a presença de ____ ou _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Ferropenia/doença falciforme
- b) Ferropenia/talassemia
- c) Talassemia/anemia hemolítica
- d) Anemia hemolítica/hepatopatia

39) Os pacientes com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico que têm Pressão Arterial (PA) elevada e são elegíveis para o tratamento com alteplase IV devem ter sua PA cuidadosamente abaixada para que sua PA sistólica seja < ____ mm Hg e sua PA diastólica seja < ____ mm Hg antes da terapia fibrinolítica IV é iniciada. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 190/120
- b) 170/110
- c) 185/110
- d) 170/115

40) Sobre o hipotireoidismo, assinale a alternativa correta.

- a) É mais comum em homens do que em mulheres
- b) Em caso de resposta positiva, no teste do pezinho, ao hipotireoidismo congênito, o tratamento precisa ser iniciado em no máximo seis meses, sob rigoroso controle médico, para evitar suas consequências, entre elas o retardo mental. Assim, o bebê poderá ficar curado e ter uma vida normal
- c) O tratamento do hipotireoidismo é feito com o uso diário de levotiroxina, que deve ser tomada a intervalos de uma semana
- d) Em adultos, na maioria das vezes, o hipotireoidismo é causado por uma inflamação denominada tireoidite de Hashimoto