



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 016. PROVA OBJETIVA

#### TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **09**.

#### *Doenças crônicas mentem*

Percepções inadequadas de enfermidades silenciosas podem trazer danos

JULIO ABRAMCZYK

A percepção inadequada pelos pacientes de uma doença crônica que atinge de 2% a 4% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido é o tema de editorial da revista *The Lancet Rheumatology* deste mês.

O editorial aborda o desafio da doença denominada gota, inflamação nas articulações causada por depósitos de cristais de urato produzidos pelo organismo do paciente.

As taxas de prescrição de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas, assim como a adesão dos pacientes ao remédio.

A adesão à terapia, principalmente quando a doença parece inativa, diz o editorial, é influenciada pelo grau de confiança do doente em seu médico, que deve insistir na manutenção do tratamento mesmo na ausência de dor.

A crise de gota, desencadeada por dor no local da inflamação, interfere na ação da articulação e diminui a qualidade de vida do paciente.

No Brasil, V. Feijó Azevedo e colaboradores da Universidade Federal do Paraná abordam, na Revista Brasileira de Reumatologia, a importância da campanha "Sua gota mente".

Eles afirmam que, apesar do tratamento nas crises dolorosas com anti-inflamatórios acabar momentaneamente com a dor, os cristais de urato responsáveis pela dor continuam presentes. E, a longo prazo, podem provocar tofos e graves danos nas articulações.

Também assinalam a importância de os médicos contribuírem para o conhecimento do paciente sobre a doença para bons resultados a longo prazo.

(Julio Abramczyk, *Doenças crônicas mentem*, Folha de S.Paulo, 25.10.2019. Acesso em 04.11.2019)

**01.** Com base nas informações apresentadas no texto, é correto afirmar que

- (A) a confiança excessiva no resultado do tratamento determina a baixa adesão à terapia.
- (B) o tratamento só terá êxito, caso realizado com anti-inflamatórios exclusivamente nas crises dolorosas.
- (C) há pouca adesão ao tratamento porque os médicos não prescrevem os remédios corretos.
- (D) o compromisso mútuo entre médico e paciente contribui para se chegar a bons resultados.
- (E) a doença é causada principalmente pela falta de conhecimento do paciente sobre as formas de tratamento.

**02.** Leia os seguintes trechos:

- **A percepção inadequada** pelos pacientes de uma doença crônica que atinge de 2% a 4% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido... (1º parágrafo)
- As taxas de **prescrição** de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas... (3º parágrafo)
- A crise de gota, **desencadeada** por dor no local da inflamação, interfere na ação da articulação... (5º parágrafo)

Considerando-se o contexto, assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, os termos destacados, sem alteração de sentido.

- (A) O discernimento impreciso; indicação; iniciada.
- (B) A falta de entendimento; vencimento; liberada.
- (C) A ausência de inépcia; vigência; provocada.
- (D) A perspicácia inapropriada; formulação; determinada.
- (E) O entendimento equivocado; recomendação; rompida.

**03.** Leia as seguintes passagens:

- ... são baixas, **assim como** a adesão dos pacientes ao remédio. (3º parágrafo)
- ... principalmente **quando** a doença parece inativa... (4º parágrafo)
- Eles afirmam que, **apesar do** tratamento nas crises dolorosas... (7º parágrafo)

Os termos destacados organizam as informações textuais e expressam, no contexto, correta e respectivamente, sentido de

- (A) concessão; finalidade; condição.
- (B) comparação; tempo; concessão.
- (C) condição; conformidade; adversidade.
- (D) explicação; condição; alternância.
- (E) proporção; alternância; contrariedade.

- 04.** Assinale a alternativa que apresenta uma leitura livre do texto em pleno acordo com a norma-padrão da língua portuguesa quanto à regência.
- (A) Os níveis de pacientes que assumem ao tratamento das chamadas doenças crônicas de modo integral são baixos.
  - (B) A crise de gota, provocada por inflamação local, prejudica à qualidade de vida do paciente.
  - (C) Em média, 3% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido são acometidos por alguma doença crônica.
  - (D) A campanha denominada por “Sua gota mente”, pretende conscientizar o brasileiro acerca das doenças crônicas.
  - (E) O desafio contra a gota foi publicado ao editorial da revista *The Lancet Rheumatology* deste mês.
- 05.** Assinale a alternativa que apresenta livre reescrita de um trecho do texto de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa quanto ao emprego e à colocação do pronome.
- (A) Quanto a uma parte dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido, atinge-lhes uma doença crônica.
  - (B) A gota tem relação com os cristais de urato. Os produzem, o organismo do paciente.
  - (C) As baixas taxas de adesão dos pacientes ao tratamento não produzem-lhes resultados mais efetivos.
  - (D) É preciso observar o grau de confiança do doente em seu médico. Reforçá-lo é fundamental para o tratamento.
  - (E) Quando julgam-na inativa, pela ausência de dor, a doença passa a agir silenciosamente.
- 06.** Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.
- (A) Colaboradores da Universidade Federal do Paraná afirmaram: “Os cristais de urato podem provocar graves danos nas articulações.”.
  - (B) A prescrição de remédios e a adesão, ao tratamento, por parte dos pacientes são baixas.
  - (C) É uma inflamação, que desencadeia a crise de gota; diagnosticada a partir do reconhecimento de intensa dor, no local.
  - (D) A ausência de dor não pode ser motivo para a interrupção do tratamento conforme o editorial diz: – (é preciso que o doente confie em seu médico).
  - (E) A qualidade de vida, do paciente, diminui pois a dor no local da inflamação é bastante intensa!
- 07.** Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto com a concordância adequada à norma-padrão da língua portuguesa.
- (A) Adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido, atingidos por uma doença crônica, chega a 4%.
  - (B) A baixa adesão dos pacientes aos remédios prejudicam o tratamento da gota.
  - (C) Os depósitos de cristais de urato produzidos pelo organismo do paciente constitui a principal causa da gota.
  - (D) A contribuição dos médicos para que os pacientes conheçam a doença resultam tratamentos mais exitosos.
  - (E) Confiança, prescrição de remédios, manutenção de tratamento, tudo é necessário para a recuperação do paciente.
- 08.** Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que respeita a norma-padrão da língua portuguesa para completar o enunciado: “Percepções inadequadas de enfermidades silenciosas podem trazer danos à
- (A) quem necessita de tratamento preventivo”.
  - (B) qualidade de vida de uma parte significativa da sociedade”.
  - (C) tratamentos que procurem diminuir as inflamações”.
  - (D) pacientes acometidos por gota”.
  - (E) pessoas displicentes com a medicina preventiva”.
- 09.** Assinale a alternativa em que há palavra ou expressão empregada em sentido figurado.
- (A) Manter os níveis normais de ácido úrico no sangue ajuda o paciente a controlar as consequências da doença.
  - (B) As taxas de prescrição de remédios para manter níveis normais do ácido úrico no sangue são baixas.
  - (C) A adesão à terapia é influenciada pelo grau de confiança do doente em seu médico.
  - (D) Colaboradores da Universidade Federal do Paraná chamam a atenção para a importância da campanha “Sua gota mente”.
  - (E) A doença provoca dor no lugar da inflamação, diminuindo a qualidade de vida do paciente.

Leia o texto para responder às questões de números 10 a 13.

### O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Fenilcetonúricos** – os comprimidos de desintegração oral contêm pequena quantidade de fenilalanina, um componente do aspartamo, portanto devem ser administrados com cautela nesses pacientes.

**Fenilcetonúricos: contém fenilalanina.**

Atenção: Este medicamento contém corantes que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.

**Gravidez** – Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

**Lactação** – Recomenda-se cautela no uso de ondansetrona em mulheres que estão amamentando.

**Pediatria** – É recomendado a administração de Vonau Flash® em crianças acima de 2 anos de idade.

**Geriatrics (idosos)** – Não é necessário ajuste de dose em pacientes idosos, embora observe-se uma redução na depuração e um aumento na meia-vida de eliminação em pacientes acima de 75 anos de idade. Em estudos clínicos de pacientes com câncer, a segurança e eficácia foram comprovadas mesmo em pacientes acima de 65 anos.

**Insuficiência hepática/renal** – Em pacientes com insuficiência hepática (função alterada do fígado) grave, não se recomenda exceder a dose diária 8 mg.

Não se considera que a insuficiência renal (função alterada do rim) influencie significativamente na eliminação ondansetrona do organismo. Portanto, não é necessário ajuste de dose nesses pacientes.

A ondansetrona, princípio ativo de Vonau Flash®, é metabolizada por enzimas do fígado, portanto, drogas indutoras ou inibidoras dessas enzimas podem alterar a sua eliminação. De acordo com os dados disponíveis, não há necessidade de ajuste de dose desses medicamentos em caso de uso ao mesmo tempo. Não são conhecidos relatos de interferência da ondansetrona em testes laboratoriais.

(MODELO DE BULA DO PACIENTE Vonau Flash® ondansetrona cloridrato. Item 4. <http://www.anvisa.gov.br/>. Acesso em 06.11.19)

#### 10. Os termos destacados em

- ... devem ser administrados **com cautela** nesses pacientes. (1º parágrafo)
- ... contém corantes que podem, **eventualmente**, causar reações alérgicas. (3º parágrafo)
- ... a segurança e eficácia foram comprovadas **mesmo** em pacientes acima de 65 anos. (7º parágrafo)

indicam no contexto, correta e respectivamente, as circunstâncias de

- (A) exclusão; afirmação; modo.
- (B) dúvida; ordem; afirmação.
- (C) modo; tempo; inclusão.
- (D) intensidade; dúvida; oposição.
- (E) meio; hipótese; causa.

#### 11. De acordo com as informações apresentadas no texto, é correto afirmar que

- (A) o medicamento não oferece risco a pacientes idosos desde que não tenham câncer.
- (B) a ondansetrona interfere na ação de drogas inibidoras de enzimas do fígado, conforme estudos disponíveis.
- (C) a ondansetrona não pode ser ingerida por quem apresenta alterações da função renal, conforme dados disponíveis.
- (D) o medicamento deve ser evitado por fenilcetonúricos, pois as reações alérgicas nesses casos, são recorrentes.
- (E) A gravidez não é impeditivo para o uso do Vonau Flash®, desde que administrado sob orientação profissional.

#### 12. Assinale a alternativa em que a palavra **por** tem o mesmo emprego que o do trecho do texto – A ondansetrona, princípio ativo de Vonau Flash®, é metabolizada **por** enzimas do fígado...

- (A) Ficou à espera de novos tratamentos, **por** orientação médica.
- (B) O medicamento só pode ser manipulado **por** laboratórios autorizados.
- (C) Evitavam o medicamento **por** pura ignorância sobre reações alérgicas.
- (D) O mais recomendável é a ingestão de apenas uma dose **por** dia.
- (E) Pesquisara **por** horas a fio, na internet, sobre o medicamento.

#### 13. Antes de usar, \_\_\_\_\_ o aspecto do medicamento. Caso ele \_\_\_\_\_ no prazo de validade e você \_\_\_\_\_ alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se \_\_\_\_\_ utilizá-lo.

(Vonau Flash® – Biolab. Bula aprovada pela Anvisa em 14.01.2019. Adaptado)

Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) observe ... esteja ... constata ... pode
- (B) observe ... esteje ... constatar ... poderá
- (C) observa ... estiver ... constate ... pudesse
- (D) observeis ... esteje ... constatou ... poderia
- (E) observe ... esteja ... constate ... poderá

Leia os quadrinhos que compõem a tira de André Dahmer para responder às questões de números 14 e 15.

MATEMÁTICA



(Folha de S.Paulo 09.11.2019. Acesso em 11.11.2019)

14. Assinale a alternativa que reescreve o diálogo do último quadrinho sem alterar o seu sentido original, utilizando apenas expressões em sentido próprio e de acordo com a norma-padrão da língua.

- (A) “Não é triste?” “Era. Quando as pessoas tinham alguma sensibilidade.”.
- (B) “Não é cruel?” “Talvez, mas hoje em dia ninguém dá a mínima.”.
- (C) “Não é de chorar por todos os poros?” “Se as pessoas ainda fossem honestas, seria.”.
- (D) “Não é revoltante?” “Revolta não é artigo da moda.”.
- (E) “Não é deprimente?” “Sim, claro, mas os novos tempos exigem novas atitudes.”.

15. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, no desenrolar do diálogo, estabelece o sentido de **posse**.

- (A) de
- (B) o
- (C) Seu
- (D) Quando
- (E) é

16. Um agente comunitário de saúde visitou 36 famílias. Desse total,  $\frac{5}{12}$  eram no bairro A,  $\frac{1}{3}$  era no bairro B, e as demais famílias, no bairro C. O número de famílias visitadas no bairro C, em relação ao número total de famílias visitadas, corresponde à fração:

- (A)  $\frac{1}{2}$
- (B)  $\frac{1}{3}$
- (C)  $\frac{1}{4}$
- (D)  $\frac{1}{5}$
- (E)  $\frac{1}{6}$

17. Em uma palestra, estavam presentes 48 mulheres e 42 homens. Ao término dessa palestra, todas essas pessoas foram divididas em grupos, para a realização de uma atividade, de modo que todos os grupos tinham o mesmo número de pessoas e na maior quantidade possível. Sabendo-se que não tinham homens e mulheres juntos, em um mesmo grupo, então o número de grupos formados somente com mulheres foi

- (A) 9.
- (B) 8.
- (C) 7.
- (D) 6.
- (E) 5.

18. Um posto de saúde de determinada região realizou exames em 120 moradores locais, para verificar se estavam infectados por determinado tipo de bactéria. Os exames mostraram que a razão do número de moradores infectados por essa bactéria para o número de moradores não infectados por essa bactéria era  $\frac{2}{3}$ . O número de moradores infectados por essa bactéria era

- (A) 72.
- (B) 66.
- (C) 60.
- (D) 54.
- (E) 48.

19. Um hospital atendeu, em um mesmo dia, 40 pessoas, das quais 20% eram adultos e as demais, crianças. Sabendo-se que 50% desses adultos e 75% dessas crianças estavam com intoxicação alimentar, então, entre essas 40 pessoas, aquelas que não estavam com intoxicação alimentar correspondiam a:

- (A) 30%
- (B) 35%
- (C) 40%
- (D) 45%
- (E) 50%

20. Uma pessoa comprou determinada quantidade de guardanapos de papel. Se ela utilizar 2 guardanapos por dia, a quantidade comprada irá durar 15 dias a mais do que duraria se ela utilizasse 3 guardanapos por dia. O número de guardanapos comprados foi

- (A) 60.
- (B) 70.
- (C) 80.
- (D) 90.
- (E) 100.

21. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de latas compradas, de alguns produtos, e o preço unitário da lata.

PRODUTO	Nº DE LATAS COMPRADAS	PREÇO POR LATA
Milho	3	R\$ 1,50
Ervilha	2	R\$ 1,95
Mix de legumes	5	R\$ 3,20
Molho de tomate	2	R\$ 2,80


Considerando-se o número total de latas compradas, na média, cada lata saiu por

- (A) R\$ 2,40.
- (B) R\$ 2,50.
- (C) R\$ 2,60.
- (D) R\$ 2,70.
- (E) R\$ 2,80.

22. Marcos e Pedro foram a um rodízio de pizzas e, juntos, comeram 14 pedaços. Sabendo-se que Marcos comeu 2 pedaços a mais do que Pedro, o número de pedaços de pizzas que Marcos comeu foi

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 10.

23. O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de domicílios visitados por agentes de saúde, em 4 regiões, A, B, C e D, de um mesmo município.



Sabendo que cada visita a um domicílio leva, aproximadamente, 15 minutos, e que o tempo gasto para visitar todos os domicílios, dessas 4 regiões, foi de 40 horas, então, o número de domicílios visitados na região A foi

- (A) 60.
- (B) 55.
- (C) 50.
- (D) 45.
- (E) 40.

24. Em um espaço retangular ABCD, com 6 m de largura, foi feito um pequeno galpão retangular, e o restante do espaço foi utilizado para uma horta comunitária, conforme mostra a figura.




Figura fora de escala

Sabendo-se que o perímetro do galpão é de 10 m, a área da horta comunitária é igual a

- (A) 34 m<sup>2</sup>.
- (B) 36 m<sup>2</sup>.
- (C) 38 m<sup>2</sup>.
- (D) 40 m<sup>2</sup>.
- (E) 42 m<sup>2</sup>.

25. Um reservatório de água, com capacidade máxima para 6000 litros, tem a forma de um prisma reto de base retangular, cujas medidas internas, em metros, estão indicadas na figura.





Figura fora de escala

Lembrando que  $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ litros}$ , a altura desse reservatório, indicada na figura pela letra h, é igual a

- (A) 0,5 m.
- (B) 1,0 m.
- (C) 1,5 m.
- (D) 2,0 m.
- (E) 2,5 m.

## R A S C U N H O

26. Tem-se a imagem parcial da guia Página Inicial do Microsoft Word 2010, em sua configuração original.




Em um documento em branco, ao iniciar a digitação, o texto estará alinhado \_\_\_\_\_ e formatado \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) à esquerda ... tachado
- (B) centralizado ... negrito e itálico
- (C) justificado ... sublinhado
- (D) justificado ... negrito e itálico
- (E) à esquerda ... sublinhado

27. No Microsoft Windows 7, em sua configuração original, assinale a alternativa correta sobre a operação de minimizar uma janela, clicando no ícone Minimizar da Barra de Título, destacado na imagem a seguir.



- (A) Significa reduzi-la até que o programa seja encerrado.
- (B) É a operação que converte a janela em um ícone na Área de Trabalho.
- (C) Significa reduzi-la a um tamanho que ocupe uma área livre da Área de Trabalho.
- (D) É a operação que converte a janela em um ícone na Barra de Tarefas.
- (E) É a operação que encerra o programa em execução.


28. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão.

	A
1	73
2	99
3	95
4	88
5	47
6	91
7	60
8	6
9	28
10	
11	0

A célula A11 contém a fórmula =CONTAR.VAZIO(A1:A9). Se o usuário alterar o conteúdo da célula A1 para um texto, apagar o conteúdo da célula A2, selecionando-a e pressionando a tecla DEL, alterar o conteúdo da célula A3 para o valor zero, alterar o conteúdo da célula A4 para um espaço em branco e, finalmente, ocultar a linha 5, assinale a alternativa que indica o conteúdo final da célula A11.

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

29. Tem-se a seguinte imagem, do painel de animação de 5 AutoFormas em um slide criado no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original.



Assinale a alternativa que indica qual será a última AutoForma a ser exibida no slide.

- (A) 1-Retângulo 4
- (B) 2-Elipse 5
- (C) 3-Triângulo isós...
- (D) 4-Hexágono 7
- (E) 5-Seta para a Di...
30. João recebeu uma mensagem de correio eletrônico por meio do aplicativo Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão. No entanto, João era o único que estava relacionado no campo Cco. Isso significa que todos os demais destinatários não sabem que João recebeu a mensagem. Assinale a alternativa que indica a pasta em que, por padrão, a mensagem foi gravada no aplicativo de João.
- (A) Rascunhos
- (B) Caixa de Entrada
- (C) Itens Lidos
- (D) Caixa de Itens Ocultos
- (E) Caixa Confidencial

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A temperatura corporal é considerada como um importante indicador físico de doença, no entanto, em idosos, esse dado deve ser avaliado de forma cautelosa, uma vez que os idosos
- (A) apresentam uma temperatura corporal muito variável.
- (B) possuem uma temperatura corporal basal maior do que a de adultos jovens.
- (C) apresentam menor capacidade de regular a temperatura corporal.
- (D) reagem rapidamente a processos infecciosos, apresentando altas temperaturas.
- (E) se agasalham com muita frequência, favorecendo episódios de hipotermia por efeito reflexo.
32. O câncer de colo de útero, apesar de prevenível, é um dos cânceres mais frequentes em mulheres no Brasil, com altas taxas de incidência e de mortalidade. Uma importante medida para sua prevenção é a coleta de exame Papanicolaou que, segundo o Ministério da Saúde, deve ser realizado em mulheres
- (A) a partir do início da sua vida sexual ativa, independentemente de sua idade.
- (B) dos 14 aos 50 anos, sem qualquer interferência com a vida sexual.
- (C) que tenham ou tiveram vida sexual e que estão entre 25 e 64 anos de idade.
- (D) até os 45 anos de idade, desde que tenham apresentado 3 exames consecutivos normais.
- (E) que apresentam corrimento vaginal, independentemente da idade ou vida sexual ativa.

- 33.** O Ministério da Saúde recomenda a vacinação universal das crianças contra Hepatite B a partir do nascimento. A aplicação da primeira dose nas primeiras 12-24h de vida resulta em elevada eficácia na prevenção da infecção vertical. Na maternidade, o técnico de enfermagem deve administrar a vacina contra a hepatite B
- (A) exclusivamente no músculo deltoide.
  - (B) preferencialmente em via subcutânea.
  - (C) preferencialmente em glúteos.
  - (D) somente em bebês com peso maior que 3kg.
  - (E) no músculo vasto lateral da coxa.
- 34.** Precauções padrão são medidas que devem ser utilizadas pelos profissionais de saúde
- (A) com o objetivo de prevenir a disseminação de microrganismos no ambiente hospitalar.
  - (B) exclusivamente em casos de pacientes com suspeita de infecção bacteriana.
  - (C) com o objetivo de evitar a contaminação de material estéril em ambiente cirúrgico.
  - (D) visando sempre sua proteção pessoal, uma vez que o contato com paciente trás risco à sua saúde.
  - (E) somente quando indicadas pelas condições clínicas dos pacientes sob seus cuidados.
- 35.** Em uma visita domiciliária, o técnico de enfermagem foi informado pela mãe, E.M.P., que seus filhos, atualmente com 4 e 6 anos, estão apresentando fezes amolecidas, perda de apetite e náuseas há dois dias. O profissional deve, entre outras orientações,
- (A) encaminhar imediatamente as crianças ao pronto atendimento.
  - (B) solicitar a realização do exame protoparasitológico de fezes.
  - (C) encaminhar para a unidade básica de saúde para receberem terapia de reidratação com supervisão.
  - (D) orientar a mãe para oferecer líquidos, como sucos, refrigerantes ou bebidas isotônicas.
  - (E) estimular a oferta de líquido de baixa osmolaridade e fracionar a dieta.
- 36.** A equipe de enfermagem manipula uma grande quantidade de materiais ao desempenhar suas funções assistenciais, gerando muitas vezes resíduos com grande potencial de risco para a saúde. Assim, é fundamental que o profissional esteja atento às condições seguras de manipulação e descarte de materiais. Nesse contexto, ao desprezar seringas e agulhas deve
- (A) acondicionar apenas as agulhas em recipiente impermeável e resistente específico.
  - (B) descartar as agulhas e as seringas em lixo hospitalar, desde que as agulhas estejam reencapadas.
  - (C) utilizar recipiente identificado para material perfuro-cortante, reencapando as agulhas antes de descartá-las.
  - (D) descartá-las em recipiente impermeável e resistente específico.
  - (E) utilizar caixa específica para material perfurocortante para depositar apenas as seringas.
- 37.** As anotações de enfermagem têm como objetivo assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e possibilitar a continuidade do processo de trabalho multiprofissional, garantindo segurança para o usuário e respaldo do ponto de vista legal e ético. Assim sendo, sua realização deve
- (A) se restringir a fatos objetivos, evitando relatos que possam interferir negativamente no ambiente de trabalho.
  - (B) ser uma atividade restrita ao enfermeiro, uma vez que se trata de um documento de valor administrativo e legal.
  - (C) fazer parte do prontuário do paciente, servindo de fonte de dados para processo administrativo, legal, de ensino e pesquisa.
  - (D) ser sempre manual, escrito a tinta ou a lápis, evitando-se rasuras, apresentando sempre a assinatura e/ou carimbo do enfermeiro responsável pela equipe.
  - (E) ser realizada por qualquer membro da equipe designado para essa atividade, desde que identifique o responsável pela execução do cuidado descrito.

- 38.** A “triagem classificatória de risco”, proposta pelo Ministério da Saúde, a ser implantada no acolhimento das Unidades de Atendimento de Urgência como um instrumento reorganizador dos processos de trabalho, deve
- (A) ser capaz de acolher o cidadão e garantir um melhor acesso aos serviços de urgência/emergência, humanizando o atendimento.
  - (B) ser realizado pelos profissionais da recepção, a partir de treinamento específico e sob a supervisão do enfermeiro.
  - (C) agilizar o atendimento dos casos de menor gravidade, a fim de que a equipe possa se dedicar mais aos pacientes graves.
  - (D) atuar como um instrumento de agilidade para o estabelecimento do diagnóstico de uma doença.
  - (E) selecionar os pacientes que realmente precisam ser atendidos e aqueles que podem ser encaminhados à unidade de saúde.
- 39.** Ao realizar visita domiciliar ao Sr. M.F., 66 anos, hipertenso, que não compareceu a sua consulta médica na semana passada, o técnico de enfermagem identificou uma PA de 140 x 100 mmHg. Ao questionar M.F. quanto ao uso de medicamento e seus hábitos de vida, reconheceu que M.F. apresentava muitas dúvidas em relação à sua condição de saúde. Nesse contexto, o técnico de enfermagem, ao compreender as dificuldades do Sr. M.F, deve prioritariamente
- (A) reagendar nova consulta médica na rotina, pois não identifica nenhuma urgência.
  - (B) encaminhar, imediatamente, para o pronto atendimento, pois seus níveis pressóricos estão muito elevados.
  - (C) reagendar nova consulta médica na Unidade Básica de Saúde, porém, na urgência, devido ao valor pressórico obtido.
  - (D) encaminhar para controle pressórico diário na Unidade de Saúde.
  - (E) propor sua participação em grupos educativos com o enfermeiro para que possa trabalhar suas dificuldades.
- 40.** O programa de controle médico de saúde ocupacional juntamente com o programa de prevenção de riscos ambientais visa a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores. Considera-se como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.
- São agentes físicos:
- (A) gases, ruídos e vapores.
  - (B) fungos, névoas e radiações ionizantes.
  - (C) vibrações, pressões anormais e temperaturas extremas.
  - (D) ultrassom, ruídos e vapores.
  - (E) bacilos, fumos, vapores.
- 41.** O técnico de enfermagem, os médicos, entre outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, que prestam assistência ao paciente, devem obrigatoriamente comunicar à autoridade de saúde a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- São doenças de notificação compulsória imediata:
- (A) febre amarela e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana.
  - (B) leptospirose e síndrome de rubéola congênita.
  - (C) hepatites virais e tétano neonatal.
  - (D) tuberculose e raiva humana.
  - (E) hanseníase e sífilis em gestante.
- 42.** Ao verificar a frequência respiratória de um paciente internado em unidade de clínica médica, o técnico de enfermagem observa que a mesma se apresenta facilitada com o paciente em posição vertical. A terminologia correspondente a esse achado, que deverá ser registrada pelo profissional no prontuário do paciente, corresponde a
- (A) dispneia.
  - (B) polipneia.
  - (C) ortopneia.
  - (D) apneia.
  - (E) bradipneia.

- 43.** Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), assinale a alternativa correta a respeito das penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no Brasil, de acordo com as infrações éticas e disciplinares cometidas pelos profissionais.
- (A) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de três testemunhas.
  - (B) A censura consiste na repreensão que será divulgada por um período de sete (7) dias nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
  - (C) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
  - (D) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
  - (E) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 15 (quinze) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- 44.** Os imunobiológicos, enquanto produtos termolábeis e/ou fotossensíveis, necessitam de armazenamento adequado para que suas características imunogênicas sejam mantidas.
- Em se tratando das vacinas, na sala de vacinação, devem ser armazenadas entre
- (A) +2 °C e -8 °C, sendo ideal +5 °C.
  - (B) +3 °C e +9 °C, sendo ideal +6 °C.
  - (C) +2 °C e +8 °C, sendo ideal +5 °C.
  - (D) +3 °C e -9 °C, sendo ideal +6 °C.
  - (E) +4 °C e 10 °C, sendo ideal +7 °C.
- 45.** Para interromper a cadeia de transmissão do sarampo é preciso vacinar os não vacinados, a partir dos 6 meses de idade, no menor tempo possível, após o contato com o caso suspeito ou confirmado da doença. Esse procedimento é denominado vacinação de bloqueio, que deve ser realizada no prazo máximo de até
- (A) 06 horas.
  - (B) 24 horas.
  - (C) 48 horas.
  - (D) 12 horas.
  - (E) 72 horas.
- 46.** T. S., sexo masculino, 51 anos, vítima de um grave acidente automobilístico, foi levado ao serviço de saúde de urgência, onde teve garantido o atendimento imediato por meio da classificação de risco. No âmbito do Sistema Único de Saúde, a situação descrita é fundamentada pelo princípio da
- (A) equidade.
  - (B) integralidade.
  - (C) humanização.
  - (D) hierarquização.
  - (E) descentralização.
- 47.** Para uma prescrição médica de SG 5% 2000 mL correr em 24 horas, a velocidade de gotejamento deve ser de
- (A) 83 gotas/min.
  - (B) 28 gotas/min.
  - (C) 41 gotas/min.
  - (D) 68 gotas/min.
  - (E) 14 gotas/min.

48. Um paciente, identificado pela unidade de saúde como caso com suspeita de tuberculose, é encaminhado ao técnico de enfermagem (TE) para que sejam fornecidas recomendações referentes à coleta da amostra de escarro em domicílio. O TE deve, entre outras ações,
- (A) entregar o recipiente ao paciente, verificando se a tampa do pote fecha bem e se já está devidamente identificado (nome do paciente e data da coleta na tampa do pote).
  - (B) orientar quanto ao procedimento de coleta: ao despertar pela manhã, lavar bem a boca, inspirar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse, repetindo a operação até obter duas eliminações de escarro, evitando que ele escorra pela parede externa do pote.
  - (C) orientar que, na impossibilidade de envio imediato da amostra para o laboratório ou unidade de saúde, ela poderá ser conservada em geladeira comum até o dia seguinte.
  - (D) informar que o pote deve ser tampado, envolto em papel alumínio e depois colocado em saco plástico, com a tampa para cima, cuidando para que permaneça nessa posição durante o transporte até a unidade de saúde.
  - (E) orientar que uma boa amostra de escarro é a que se obtém da faringe e não por aspiração de secreções nasais, e nem a que contém somente saliva, sendo que o volume ideal é de 2 mL a 8 mL.
49. No que diz respeito às boas práticas para o processamento de produtos para saúde, é correto afirmar que
- (A) o processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado da área limpa para a área suja.
  - (B) o Serviço de Saúde é isento da responsabilidade pela segurança do processamento dos produtos para saúde realizado por empresa processadora por ele contratada.
  - (C) produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.
  - (D) produtos para saúde utilizados na inaloterapia devem ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.
  - (E) produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza.
50. No que se refere ao esquema de vacinação para a gestante, consta, no Calendário de vacinação para o estado de São Paulo, entre outras recomendações, que
- (A) o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina hepatite B é de 2 semanas.
  - (B) o intervalo para a terceira dose da vacina hepatite B pode ser de dois meses após a segunda, desde que o intervalo de tempo decorrido da primeira dose seja, no mínimo, de quatro meses.
  - (C) caso a gestante tenha recebido duas ou mais doses das vacinas tetravalente, DTP, dTpa, dT, aplicar uma dose de reforço, com a vacina dTpa.
  - (D) caso a gestante apresente documentação com registro de uma dose da vacina SCR, aplicar a segunda dose até no máximo 28 semanas de gestação.
  - (E) a vacina dTpa deve ser administrada preferencialmente entre a 20<sup>a</sup> e 24<sup>a</sup> semana, a cada gestação.



