

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- No(s) item(ns) eventualmente constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunhos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- 1 O atendimento integral, uma das diretrizes do SUS, refere-se à atenção integral a todos, com prioridade para as atividades preventivas e sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- 2 Ao SUS compete ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da criação e execução de política de saneamento básico, bem como colaborar com a proteção do meio ambiente, neste incluído o meio ambiente de trabalho.
- 3 As instituições privadas só podem participar do SUS se forem entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

A transição demográfica e epidemiológica vivida pelo Brasil nas últimas décadas demonstra um envelhecimento populacional rápido e intenso, com consequências importantes para o país. Na saúde, especialmente, a consequência é a necessidade de políticas específicas que considerem as peculiaridades da pessoa idosa. Dado esse contexto, em 2006, foi aprovada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI). A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 4 As metas da diretriz Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável da PNSPI incluem preparar o indivíduo para o envelhecimento com a manutenção da sua capacidade funcional e da sua autonomia, incentivando a responsabilidade pessoal.
- 5 A diretriz Atenção Integral e Integrada à Saúde da Pessoa Idosa da PNSPI estabelece dois grandes e importantes eixos norteadores para a integralidade de ações: o enfrentamento de fragilidades da pessoa idosa, da família e do sistema de saúde; e a promoção da saúde e da integração social em todos os níveis de atenção.
- 6 Com referência à educação, a PNSPI propõe a articulação entre diferentes setores para proporcionar a inclusão nos currículos escolares de disciplinas que abordem o processo de envelhecimento, que valorizem a pessoa idosa e que promovam o conhecimento de profissionais sobre as especificidades da pessoa idosa.

Acerca da Política Nacional de Humanização (PNH), política pública implementada no SUS que tem como finalidade transformar as relações de trabalho, melhorando o grau de contato e a comunicação entre pessoas e grupos, julgue os itens subsequentes.

- 7 A transversalidade incentiva que as diferentes especialidades e práticas de saúde desconsiderem a experiência daquele que recebe a assistência.
- 8 O fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, de modo a estimular a transdisciplinaridade e a grupalidade, é um dos princípios norteadores da PNH.
- 9 Ambiência é um programa criado no âmbito da PNH para dar visibilidade à experiência dos trabalhadores, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho.
- 10 A PNH deve fazer parte do conteúdo profissionalizante na graduação, na pós-graduação e na extensão acadêmica em saúde, devendo estar vinculada aos polos de educação permanente e às instituições formadoras.

Julgue os itens seguintes, relativos ao Pacto pela Saúde.

- 11 Denomina-se Pacto pela Saúde um conjunto de reformas relacionadas ao fortalecimento das relações institucionais e da gestão do SUS.
- 12 Quando foi estabelecido, o Pacto pela Saúde integrou cinco componentes prioritários: o Pacto pela Vida, o Pacto de Direitos e Deveres do SUS, o Pacto em Defesa do SUS, o Pacto de Humanização e o Pacto de Gestão do SUS.
- 13 O Pacto pela Saúde contribuiu para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama, medidas afirmadas no âmbito do Pacto em Defesa do SUS.
- 14 Embora proponha alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade do sistema de saúde considerando as necessidades da população, o Pacto pela Saúde desconsidera as diferenças regionais do Brasil.
- 15 O Pacto pela Saúde requer monitoramento permanente dos estados com relação aos municípios do seu território, dos municípios com relação ao estado, dos municípios e dos estados com relação à União e da União com relação aos estados, municípios e ao Distrito Federal.

Acerca da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), julgue os próximos itens.

- 16 Entre os valores e princípios do PNPS inclui-se o reconhecimento da subjetividade das pessoas e da coletividade no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida.
- 17 A PNPS é uma política de atenção à saúde das pessoas com agravos específicos.
- 18 A valorização dos saberes populares e tradicionais e das práticas integrativas e complementares é um dos objetivos da PNPS.
- 19 A PNPS tem como uma de suas principais diretrizes a promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência.
- 20 A solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça social e a inclusão social são valores importantes na efetivação da PNPS.

Julgue os itens seguintes, referentes à Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).

- 21 A PNAN visa melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis.
- 22 Componente da PNAN, a diretriz Promoção da Alimentação Adequada e Saudável consiste na descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população e de seus fatores determinantes.
- 23 A PNAN, cuja finalidade é a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio de medidas coletivas, garante a redução do sobrepeso, da obesidade e de doenças crônicas associadas à alimentação e nutrição.

A Política Nacional de Vigilância em Saúde

- 24 contempla toda a população no território nacional, sem priorizar territórios, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade.
- 25 abrange somente os serviços de saúde pública.

Julgue os próximos itens, relativos a planejamento, organização e gestão dos serviços de saúde.

- 26 O Pacto de Gestão apresenta diretrizes e define responsabilidade sanitária para cada um dos entes da Federação.
- 27 O projeto terapêutico singular é um protocolo criado especificamente para o planejamento e a intervenção na saúde do indivíduo.
- 28 Na abordagem do planejamento estratégico-situacional em saúde, são fundamentais quatro momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional.
- 29 O plano municipal de saúde deve seguir a legislação do SUS, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano diretor de desenvolvimento urbano, a programação pactuada integrada, as resoluções dos conselhos de saúde e das comissões intergestores tripartite e bipartite.
- 30 As redes de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) podem ser organizadas por especialidade, nível de atenção, ciclo de vida ou outros critérios, desde que mantida a finalidade de melhorar a racionalidade e a eficiência dos serviços.

Acerca do Sistema de Informação em Saúde, julgue os itens subseqüentes.

- 31 O acesso ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) é restrito aos gestores municipais e estaduais e sua equipe autorizada.
- 32 O processamento e o controle dos pagamentos realizados diretamente aos prestadores de serviços do SUS são disponibilizados ao público pelo Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS (SGIF/SUS).
- 33 As informações sobre quimioterapia, radioterapia e hemodiálise realizadas no país são encontradas em subsistema do Sistema de Informações Ambulatoriais (SAI/SUS) de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Alto Custo (APAC).
- 34 Os eventos adversos pós-vacinação deverão ser notificados e registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Julgue os seguintes itens, acerca de indicadores e tipos de estudos epidemiológicos.

- 35 O ensaio clínico randomizado é uma pesquisa de natureza retrospectiva que parte do efeito (doença) para elucidar suas causas (exposição) nos indivíduos e na coletividade.
- 36 O indicador epidemiológico adequado para a morbidade por exposição acidental à radiação nuclear é a incidência acumulativa ou cumulativa ou cumulada.
- 37 Os inquéritos de morbidade por doença mental podem ser realizados em duas etapas: rastreamento e confirmação diagnóstica.
- 38 No Brasil, a queda nas taxas de prevalências e proporção de deformidades entre os casos diagnosticados de hanseníase são indicadores satisfatórios do Programa Nacional de Controle da Hanseníase.
- 39 O coeficiente de prevalência de doenças congênitas contém informações dos casos de natimortos que realizam autópsia.
- 40 O estudo caso-controle compara um grupo de indivíduos expostos ao risco de contrair a doença com outro grupo de indivíduos não expostos ao risco.

Acerca da vigilância em saúde, julgue os itens que se seguem.

- 41 O monitoramento dos níveis sanguíneos de chumbo em crianças de determinada comunidade é considerado um marcador biológico da exposição ambiental.
- 42 Para realizar-se o diagnóstico laboratorial da síndrome gripal em unidade sentinela, coletam-se duas amostras da secreção da nasofaringe, preferencialmente entre o oitavo e décimo dia após o início dos primeiros sintomas.
- 43 A erradicação de uma doença infecciosa pode ser impedida se a população deixar de atuar na mudança de comportamento para romper a cadeia de transmissão.
- 44 Os reservatórios naturais do vírus da leptospirose são os roedores silvestres, que contaminam o ambiente com suas excretas e secreções, as quais, inaladas pelo homem, podem infectá-lo.
- 45 A investigação epidemiológica do tracoma tem como objetivo a busca ativa no domicílio e a realização de campanhas educativas em saúde durante os meses sazonais da doença, envolvendo a participação dos moradores do território.
- 46 A vigilância epidemiológica da esquistossomose compreende a busca ativa dos portadores do *Schistosoma mansoni* por meio de inquéritos colproscópicos periódicos, da demanda espontânea à rede básica e do tratamento dos infectados.

Julgue os itens subsequentes relativos à segurança da pessoa idosa no âmbito da atenção à saúde.

- 47 Constitui medida de segurança importante a utilização de sinalização visual para a identificação de risco de queda do paciente internado, a fim de alertar toda a equipe hospitalar.
 - 48 Episódios de calafrio e febre durante a sessão são frequentes em idosos que realizam hemodiálise pela primeira vez.
 - 49 Por ser previsto pela equipe de saúde durante a internação, o risco de ocorrência de úlcera por pressão em idosos não é passível de ser notificado como evento adverso.
 - 50 A notificação de eventos adversos que acontecem com o paciente durante e após seu atendimento em serviços de saúde pode ser feita pelo paciente, por familiares, cuidadores e acompanhantes.
-

Espaço livre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere ao raciocínio clínico no processo de intervenção da terapia ocupacional, a AOTA (American Occupational Therapy Association, 1986) tem realizado uma série de estudos para examinar a prática profissional. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 51 O raciocínio clínico pode ser definido como a maneira de pensar naquilo que se faz.
- 52 Estudiosos identificam dois importantes aspectos do raciocínio clínico: o mecânico — que, ligado à prática da medicina, trata de fatores biomecânicos —; e o fenomenológico — que aborda a experiência de ser no mundo.
- 53 Para organizar e processar dados, desenvolver e modificar planos e ações durante todas as fases do processo de intervenção, o profissional pode utilizar três vias de raciocínio simultaneamente: raciocínio processual, interativo e condicional.
- 54 O raciocínio narrativo utiliza a criação de histórias como uma maneira de compreender a experiência do paciente.

Com relação ao processo de avaliação em terapia ocupacional, que se refere a obtenção e interpretação de dados necessários para a intervenção, julgue os próximos itens.

- 55 No planejamento da intervenção terapêutica ocupacional, a utilização da prática centrada no cliente deve levar em consideração a colaboração do paciente, sem o envolvimento da família.
- 56 O diagnóstico terapêutico ocupacional baseia-se nas potencialidades e nas disfunções dos papéis ocupacionais do paciente.

Acerca das estratégias específicas de tratamento da percepção de um paciente adulto com lesão cerebral, julgue os itens subsecutivos.

- 57 A transferência do treinamento e os métodos funcionais são os dois gêneros de métodos mais utilizados no tratamento dos problemas perceptivos.
- 58 Uma das estratégias relacionadas à imagem e ao esquema corporais consiste em incentivar o paciente a identificar as partes do seu corpo durante as atividades funcionais.
- 59 O planejamento de atividades com utilização do método mnemônico baseia-se em estratégias específicas da percepção.
- 60 Desenhar e designar as partes de um corpo ou do rosto são duas estratégias adotadas nos métodos funcionais.

Um homem de 64 anos de idade, com histórico de fibrilação atrial, compareceu ao ambulatório com quadro de fala ininteligível e incapacidade de movimentar o lado direito do corpo, problemas que tinham se iniciado pela manhã, após ele ter acordado. Exames mostraram grande acidente vascular cerebral direito na artéria cerebral média. Para proceder à avaliação do caso, o terapeuta realizou coleta das informações iniciais.

A respeito da situação hipotética apresentada e dos múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue os itens seguintes.

- 61 A forma como esse homem chegou ao ambulatório e a sua idade não são indicativos de possível prescrição de equipamentos adaptados para aumentar sua segurança e independência.
- 62 Em geral, a anamnese é insuficiente para que o terapeuta identifique o foco de intervenção; por isso, são necessários exames complementares para o planejamento inicial do programa de reabilitação.
- 63 O método neuroevolutivo da hemiplegia em adultos, conhecido como Bobath, é uma intervenção terapêutica indicada para o paciente dessa situação.
- 64 A hipertensão é considerada fator de risco modificável isolado e importante nos casos de AVC hemorrágico.
- 65 Na situação descrita, durante o processo de reabilitação para desenvolver uma atividade na postura sentada, será necessário estabelecer um alinhamento neutro, isto é, uma posição de prontidão para o funcionamento dos membros superiores.
- 66 A incapacidade de assumir a postura de pé é bastante comum no pós-AVC, e as estratégias para um efetivo controle ereto depende das funções cognitivas.

Considerando-se a terapia ocupacional a partir de uma abordagem psicodinâmica, é possível elencar dois aspectos importantes: a atividade e a relação terapeuta-paciente-atividade. Com referência a esse assunto, julgue os itens subseqüentes.

- 67 Em geral, a ação torna-se mais reveladora do inconsciente do que a palavra, o que pode fazer com que a atividade ganhe toda uma dimensão de expressividade e simbolismo.
- 68 A atividade, como forma de comunicação, representa grande valor no processo psicoterapêutico e no entendimento do mundo interno do paciente.
- 69 Na relação terapeuta-paciente-atividade, o produto final é secundário; o que se torna significativo é a inter-relação que o indivíduo estabelece por meio da atividade com o terapeuta, podendo ocorrer uma dinâmica em um campo transicional.
- 70 Se o processo psicodinâmico ocorrer dentro de uma abordagem grupal, será desnecessária a realização da análise da atividade.

A respeito da função manual, atividade que requer integração das reações e reflexos existentes nos primeiros meses de vida e que ocorre de forma ordenada e gradativa com as experiências sensório-motoras globais do bebê, julgue os próximos itens.

- 71 O alcance preciso dos objetos e a manipulação fina adequada progridem a partir do desenvolvimento motor fino nos bebês.
- 72 A correção da postura do punho na criança que tenha paralisia cerebral espástica e realize preensão por meio do mecanismo de tenodese não acarretará interferência no objetivo funcional proposto pelo terapeuta.
- 73 Atividades que propiciem grande amplitude articular auxiliam na aquisição dos movimentos distais dos membros superiores.
- 74 Para que as informações sensório-motoras sejam recebidas, decodificadas e somadas no engrama motor, o terapeuta deverá oferecer ao bebê brincadeiras que envolvam variações de tamanho, formato, peso, temperatura, textura, unimanualidade e bimanualidade, e diferentes preensões.

Com relação à oncologia pediátrica e à atuação da terapia ocupacional nessa área, julgue os itens a seguir.

- 75 A leucemia linfoblástica é uma neoplasia de grande incidência em crianças de até 11 anos de idade.
- 76 Leucemias têm relação causal com exposição ocupacional ao benzeno.
- 77 É contraindicado o uso de órteses e de recursos para mobilidade e acessibilidade no tratamento de crianças com câncer e acometimento nas funções motoras e de sensibilidade.
- 78 O terapeuta ocupacional deve estar atento à agilidade das intervenções, pois o câncer em crianças apresenta proliferação rápida e é muito invasivo.
- 79 Acolhimento, escuta qualificada e valorização da prática interdisciplinar são exemplos de tecnologias leves de cuidado que o terapeuta ocupacional deve utilizar para alcançar a atenção integral à saúde de crianças com câncer.

Julgue os próximos itens, relativos à assistência e ao tratamento de crianças com câncer.

- 80 Unidades de terapia intensiva pediátrica devem garantir assistência de terapia ocupacional por meios próprios ou terceirizados.
- 81 O hospital das especialidades é a tendência atual para o tratamento de casos de alta complexidade em oncologia.

A mastectomia é um dos procedimentos cirúrgicos realizados no tratamento de mulheres acometidas por câncer de mama. Com relação ao plano de reabilitação prescrito por terapeutas ocupacionais nesses casos, julgue os itens que se seguem.

- 82 A abordagem do terapeuta ocupacional só terá início quando a paciente estiver em condições de deambulação.
- 83 O objetivo do plano de reabilitação consiste na prevenção da limitação funcional do membro superior do lado operado, da retração cicatricial e do surgimento de linfomas.
- 84 Durante a execução dos exercícios, o terapeuta ocupacional deve estar atento às queixas de dor na região interna do braço das pacientes que foram submetidas à extração do nervo cutâneo medial, pois, em alguns casos, a cirurgia pode ocasionar hiperestesia ao movimento.
- 85 Por exigirem menos esforço físico e cognitivo das pacientes, as atividades instrumentais de vida diária devem ser priorizadas no tratamento pós-cirúrgico.

A respeito do tratamento e dos cuidados gerais provenientes do campo da terapia ocupacional com o paciente oncológico, julgue os itens seguintes.

- 86 O foco do trabalho terapêutico ocupacional no cuidado ao paciente oncológico é o desenvolvimento e a manutenção da capacidade funcional desse paciente, incentivando a eficiência na execução das tarefas cotidianas com preservação de habilidades motoras e cognitivas.
- 87 O tempo de tratamento e a incerteza de seus resultados influenciam na alteração do desempenho ocupacional, com prejuízo, principalmente, nas áreas de produtividade e lazer.
- 88 É essencial ao terapeuta ocupacional que trabalha com cuidados paliativos incentivar o paciente a aceitar sua morte e suas limitações, restringindo o grau de envolvimento em atividades específicas, de modo que também seja trabalhada a angústia dos familiares até que o paciente chegue a óbito.
- 89 Pacientes em tratamento quimioterápico apresentam expressivas demandas para terapia ocupacional, especialmente no que tange à orientação em atividades da vida diária.

Com referência à atuação do terapeuta ocupacional em equipes hospitalares, julgue os próximos itens.

- 90 Projetos hospitalares que necessitem de empenho do terapeuta ocupacional e que independam de equipe interdisciplinar incluem, entre outros: oficinas de geração de renda, semana das crianças e atividades na sala de espera.
- 91 A atuação do terapeuta ocupacional em equipes multiprofissionais hospitalares contribui para que pacientes oncológicos apresentem menos queixas relativas aos sintomas da doença.
- 92 O terapeuta ocupacional deve preocupar-se inicialmente com a ruptura sofrida pelo paciente em relação às atividades que exercia externamente, somada à nova rotina de atividades hospitalares, incentivando-o, aos poucos, ao desenvolvimento de maior independência da enfermagem e dos familiares, para que sinta condições de cuidar de si mesmo.

Tendo em vista que a utilização de modelos conceituais e de avaliações em terapia ocupacional é essencial para conhecer a condição do paciente e orientar intervenções na prática, julgue os itens a seguir, relativos a esse assunto.

- 93 A Medida de Desempenho Ocupacional Canadense (COPM) é indicada para mensurar o esforço despendido nos movimentos para evitar a fadiga.
- 94 O método de avaliação PEDI (Pediatric Evaluation Disability Inventory) mensura o desempenho funcional focado em três habilidades principais: cognição, autocuidado e desenvolvimento motor.
- 95 O uso do protocolo de avaliação PEDI (Pediatric Evaluation Disability Inventory) tem como objetivo medir a função emocional e cognitiva da criança.
- 96 A escala de faces e o inventário de dor Wisconsin podem ser utilizados para avaliação de dor em crianças e adolescentes, respectivamente.
- 97 A ciência da ocupação estuda o emprego das emoções emergidas do significado das ocupações diárias na construção do cotidiano e da história de vida.

A respeito do uso de órteses como recurso terapêutico ocupacional, julgue os itens a seguir.

- 98** Órteses para pacientes com síndrome do túnel do carpo têm como objetivo imobilizar a articulação metacarpofalângiana do polegar.
- 99** Por favorecerem a flexão do punho, órteses dinâmicas são recomendadas para pacientes com lesões do nervo radial decorrentes de paralisia dos músculos flexores do carpo e dos dedos.
- 100** Órteses de imobilização que envolvam as articulações do punho e as articulações metacarpofalângianas e interfalângianas proximais e distais são indicadas para a fase pós-operatória de cirurgias de contratura de Dupuytren.
- 101** As órteses para pacientes com lesões do nervo ulnar servem para promover a extensão das articulações interfalângianas e a flexão das articulações metacarpofalângianas dos dedos IV e V.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao atendimento a pacientes com doenças cardiorrespiratórias pela equipe de terapia ocupacional.

- 102** Atividades de alto gasto metabólico são identificadas por escores altos na escala de esforço de Borg e baixos níveis de equivalente metabólico de tarefa (MET).
- 103** O movimento de expiração do ar que o paciente executa durante a realização de força pode auxiliar a controlar a pressão arterial, pois reduz a pressão sistólica durante essa atividade.
- 104** Utilização dos grandes músculos proximais, diminuição da carga e favorecimento de contrações isométricas são estratégias eficazes que devem ser utilizadas em pacientes cardiopatas.
- 105** Devido ao risco elevado de hipóxia em pacientes com enfisema pulmonar, deve-se evitar a realização de respiração diafragmática.

A respeito do atendimento terapêutico ocupacional em oncologia pediátrica, julgue os itens subsequentes.

- 106** Graduação de atividades, fortalecimento por contrações musculares isométricas e manutenção da amplitude de movimento (ADM) ativa e passiva são estratégias para reduzir disfunções secundárias à hospitalização de pacientes oncológicos pediátricos.
- 107** Crianças hospitalizadas para tratamento com radioterapia apresentam risco elevado de neutropenia em relação a pacientes tratados por quimioterapia.
- 108** Paralisia dos músculos extensores do punho e dos dedos, pé equino e dor periférica são sintomas comuns na neuropatia induzida por quimioterapia.
- 109** Função neuroendócrina anormal, malignidade secundária e necrose avascular são complicações observadas entre os pacientes que passaram por transplante de medula óssea.
- 110** No tratamento de crianças hospitalizadas em unidade oncológica, deve-se evitar o estímulo à participação social e o treino de habilidades de *coping*.

Julgue os próximos itens, a respeito do tratamento de pacientes adultos com afecções neurológicas em fase aguda.

- 111** A ocorrência de amnésia pós-traumática indica pior prognóstico para o desempenho de habilidades motoras no caso de pacientes que sofreram traumatismo cranioencefálico.
- 112** Durante o tratamento de pacientes com acometimento dos membros superiores, deve-se priorizar o tempo de prática em detrimento do número de repetições.
- 113** A terapia do espelho é indicada em casos graves e severos, sendo eficaz para a melhora da função motora e desempenho em atividades para pacientes pós-acidente vascular encefálico.
- 114** A Medida de Independência Funcional (MIF), o Índice de Barthel e a MAS (Motor Assessment Scale) são instrumentos indicados para a avaliação do idoso pós-acidente vascular encefálico.
- 115** O conceito neuroevolutivo e o modelo de Bruunnstrom são abordagens adotadas na intervenção com foco em componentes de desempenho.

A respeito das avaliações de crianças e adolescentes utilizadas pelos terapeutas ocupacionais, julgue os itens subsequentes.

- 116** A CARS (Childhood Autism Rating Scale) é usada para identificar crianças com autismo, mediante observação direta.
- 117** A avaliação do desenvolvimento Bayley III, que visa identificar atrasos de desenvolvimento em múltiplas áreas, é um questionário aplicado a pais e cuidadores de crianças com idade entre um mês e sessenta e seis meses.
- 118** A Medida de Independência Funcional para Crianças (WeeFIM) avalia a habilidade para desempenho de atividades de autocuidado, mobilidade e execução de tarefas cognitivas.
- 119** O teste de Denver II, ferramenta de triagem para crianças com até onze anos e onze meses de idade, avalia quatro áreas: pessoal-social, cognição, linguagem e motor grosso.
- 120** A PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) avalia a capacidade funcional e o desempenho de crianças e adolescentes com deficiência nos domínios de autocuidado, mobilidade e cognição, com ênfase nos componentes de desempenho.