



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 085. PROVA OBJETIVA

#### MÉDICO AMBULATORIAL EM CLÍNICAS BÁSICAS E ESPECIALIDADES – CLÍNICO GERAL

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_

## CONHECIMENTOS GERAIS

### POLÍTICA DE SAÚDE

- 01.** Ao se afirmar que o Sistema Único de Saúde – SUS garante o direito à vida e à igualdade de acesso sem distinção de raça, sexo, religião ou qualquer forma de discriminação, refere-se ao princípio da
- (A) transversalidade.
  - (B) equidade.
  - (C) universalidade.
  - (D) integralidade.
  - (E) gratuidade.
- 02.** As Comissões Intergestores Bipartite – CIB são instâncias de representação, monitoramento e pactuação política e administrativa utilizadas pelo SUS. Elas são constituídas por representantes dos gestores
- (A) municipais e federais.
  - (B) municipais e estaduais.
  - (C) estaduais e federais.
  - (D) municipais, estaduais, federais e dos respectivos conselhos de saúde.
  - (E) públicos e das organizações da sociedade civil.
- 03.** Tanto a previdência como a assistência social integram a seguridade social, conforme estabelecido pela Constituição Federal. É correto afirmar que a previdência e a assistência são, respectivamente, de caráter
- (A) contributivo e não contributivo.
  - (B) não contributivo e contributivo.
  - (C) universal e seletivo.
  - (D) seletivo e universal.
  - (E) não obrigatório e obrigatório.
- 04.** Um homem de nacionalidade boliviana, em situação irregular do ponto de vista da imigração, chega a uma unidade de saúde queixando-se de dor precordial intensa. A recepção o coloca para ser atendido pelo médico antes dos demais pacientes que já tinham consultas de rotina, agendadas previamente. É correto afirmar que
- (A) ele não poderia ter sido atendido, por ser estrangeiro em situação irregular.
  - (B) ele não poderia ter sido atendido antes dos pacientes que já aguardavam o atendimento na unidade, com consultas previamente agendadas.
  - (C) o atendimento prestado seguiu os princípios da universalidade e da integralidade.
  - (D) atendimento prestado seguiu os princípios da intersetorialidade e da resolutividade.
  - (E) o atendimento prestado seguiu os princípios da universalidade e da equidade.
- 05.** De acordo com as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua, importante iniciativa para o atendimento da população em situação de rua, é correto afirmar que
- (A) não está incluída, dentre as suas atividades, a busca ativa e o cuidado aos usuários de álcool, crack e outras drogas, para não haver conflito com as ações dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS.
  - (B) a realização de atividades educativas e culturais (educativas e lúdicas) não faz parte das ações a serem desenvolvidas, pois, apesar de importantes, extrapolam a área da saúde.
  - (C) suas atividades devem ser realizadas de forma itinerante e seu horário de funcionamento deverá ser adequado às demandas das pessoas em situação de rua.
  - (D) essas equipes devem, obrigatoriamente, incluir o profissional médico.
  - (E) sua implantação, credenciamento e liberação do financiamento só são permitidos para municípios com população maior que 100 000 habitantes.
- 06.** A leptospirose é um problema mundial de saúde pública que ocorre em áreas urbanas e rurais. No Brasil, ocorre durante todos os meses do ano em todas as regiões do País, predominantemente nos meses com elevados índices pluviométricos.
- Com relação a essa doença, é correto afirmar que
- (A) sua incidência é semelhante em todos os extratos socioeconômicos da população.
  - (B) é uma antrozoose que tem como principais hospedeiros primários os animais domésticos e de produção: cães, bovinos, suínos, ovinos, caprinos e equinos.
  - (C) a infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, e a penetração do microrganismo pode se dar por meio da pele lesada ou íntegra, ou das mucosas da boca, narinas e olhos.
  - (D) apesar da elevada incidência em determinadas áreas e épocas do ano, apresenta baixa letalidade.
  - (E) a vacina contra ela faz parte do calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde.
- 07.** Um trabalhador da limpeza urbana suspeita de leptospirose, após ter desenvolvido ações de apoio à população em área de alagamento no local onde mora, fora do seu horário de trabalho.
- Com relação à notificação desse agravo junto ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, é correto afirmar que
- (A) esse não é um agravo de notificação obrigatória.
  - (B) a notificação não deve ser feita, porque a situação não caracteriza acidente de trabalho.
  - (C) a notificação só deve ser feita após e se o caso for confirmado.
  - (D) a notificação deve ser feita de imediato (até 24h).
  - (E) a notificação deve ser feita no prazo de 1 semana.

- 08.** Segundo o Ministério da Saúde, as taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas estão diminuindo em nosso país. Assinale possíveis fatores que devem ter contribuído para essa diminuição.
- (A) Desenvolvimento de novos medicamentos e facilidade de acesso a eles.
  - (B) Melhoria no padrão de alimentação e aumento da prática de esportes.
  - (C) Educação para a saúde e maior acesso a alimentos naturais.
  - (D) Controle do tabagismo e maior acesso à atenção primária.
  - (E) Aumento do número de serviços de saúde especializados e maior acesso a novos medicamentos.
- 09.** A percepção da complexidade das necessidades sociais dos sujeitos que utilizam os serviços de saúde, e a identificação dos limites da prática clínica centrada na doença, ultrapassando-se o ato de definir uma conduta a partir do diagnóstico, não desconsiderando sua importância, diz respeito ao conceito de
- (A) integralidade da assistência.
  - (B) clínica ampliada.
  - (C) medicina social.
  - (D) saúde pública.
  - (E) medicina baseada em evidências.
- 10.** A vacina BCG, que protege contra a tuberculose, deve ser aplicada
- (A) em dose única, logo após o nascimento.
  - (B) em 3 doses, com intervalos de 1 mês, iniciando logo após o nascimento.
  - (C) em dose única, com 3 meses de idade.
  - (D) em dose única, a partir dos 4 anos de idade.
  - (E) em duas doses, a primeira logo após o nascimento e a segunda com 1 ano de idade.
- 11.** A legislação que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS define como instâncias deliberativas, em cada instância de governo,
- (A) a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
  - (B) a Comissão Intergestores Bipartite e a Comissão Intergestores Tripartite.
  - (C) a Comissão Intersetorial de Saúde e o Conselho de Saúde.
  - (D) a Conferência de Saúde e o poder legislativo.
  - (E) a Comissão Intersetorial de Saúde e a Conferência de Saúde.
- 12.** O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde deve ser firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- Esse contrato visa a garantir, aos usuários, a
- (A) gratuidade da assistência.
  - (B) efetividade da assistência.
  - (C) equidade da assistência.
  - (D) amplitude da assistência.
  - (E) integralidade da assistência.
- 13.** A suposição de que associações produzidas em nível de agregado, correlacionando médias, aplicam-se ao nível individual é chamada de
- (A) inferência.
  - (B) dedução.
  - (C) erro sistemático.
  - (D) erro tipo I.
  - (E) falácia ecológica.
- 14.** Considera-se risco como sendo a probabilidade de ocorrência de um resultado desfavorável, de um dano ou de um fenômeno indesejado. Ele pode ser estimado por meio do coeficiente
- (A) de ataque.
  - (B) de incidência.
  - (C) de gravidade.
  - (D) de letalidade.
  - (E) específico.
- 15.** Um estudo que visa a testar hipóteses etiológicas, constituído pelo acompanhamento, ao longo do tempo, de grupos considerados sadios quanto à doença sob investigação, sendo um exposto a um fator de risco suposto como causa da doença e outro grupo não exposto a esse fator, é denominado de estudo
- (A) ecológico.
  - (B) seccional.
  - (C) transversal.
  - (D) caso-controle.
  - (E) de coorte.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Paciente com 70 anos de idade, tabagista 40 maços/ano, hipertenso controlado com 50 mg de losartana, tem, na ultrassonografia, aneurisma abdominal sacular, infrarrenal de 4 cm de diâmetro e sem alterações no exame físico. Recentemente, teve quadro clínico de sinusopatia aguda. Qual(is) das seguintes medicações deve(m) ser evitada(s)?
- (A) Cefuroxima.
  - (B) Levofloxacino.
  - (C) Amoxicilina e clavulanato.
  - (D) Amoxicilina.
  - (E) Azitromicina.
17. Paciente do sexo feminino, 67 anos, teve diagnóstico de acidente vascular cerebral há 7 dias. No exame físico, além da hemiparesia direita, qual dos seguintes achados indicaria uma etiologia mais provável?
- (A) Aumento das articulações interfalangeanas proximais.
  - (B) Fígado palpável a 3 cm do rebordo costal direito.
  - (C) Estertores em base posterior direita.
  - (D) Sopro diastólico em área mitral.
  - (E) Hipotensão postural.
18. Uma paciente apresenta quadro de obesidade e quadro demencial progressivo. Os exames têm mostrado níveis de triglicérides em torno de 800 mg/dL, repetidamente. Entre as medidas para o controle da hipertrigliceridemia, está suspender
- (A) tiazídicos.
  - (B) galantamina.
  - (C) quetiapina.
  - (D) empagliflozina.
  - (E) losartana.
19. Em uma escola infantil, há um surto de influenza do tipo A com sintomas respiratórios e coriza. A orientação é de isolamento dos professores acometidos até o
- (A) terceiro dia após os sintomas.
  - (B) quinto dia após os sintomas.
  - (C) quinto dia após o início dos sintomas, se assintomáticos.
  - (D) sétimo dia após o início dos sintomas, se assintomáticos.
  - (E) décimo quarto dia após o início dos sintomas.
20. O caso de um paciente com hepatite B crônica com anti HbsAg negativo e HbsAg positivo tem pior prognóstico quando apresentar
- (A) leucopenia e for do sexo feminino.
  - (B) plaquetopenia e for da raça negra.
  - (C) coinfeção com HIV e com inversão da relação AST/ALT.
  - (D) idade maior que 30 anos e tabagismo.
  - (E) plaquetose e for de origem asiática.
21. A utilização de glifozinas tem como vantagens a menor incidência de acidentes vasculares cerebrais e coronariopatias, mas aumenta o risco de infecções do trato gênito urinário e
- (A) monilíase esofágica.
  - (B) cetoacidose diabética.
  - (C) hiponatremia.
  - (D) diarreia.
  - (E) refluxo gastroesofágico.
22. Considere o caso de um paciente com 45 anos, com *déficit* cognitivo leve associado à síndrome da apneia do sono. Na investigação, você encontra TSH = 15 mUI/L. Qual das seguintes medicações deve ser evitada?
- (A) Analgésicos opioides.
  - (B) Trazodona.
  - (C) Betabloqueadores.
  - (D) Antiagregantes plaquetários.
  - (E) Inibidores da enzima de conversão da angiotensina.
23. Uma paciente apresenta náuseas e perda ponderal de 15 kg nos últimos 4 meses. Nos exames, você detecta sódio de 132 mEq/L, potássio de 5,6 mEq/L e eosinófilos de 7%. Compatível com este quadro, no exame físico, será encontrada(o)
- (A) acantose *nigricans*.
  - (B) assimetria dos pulsos periféricos.
  - (C) hepatomegalia a 3 cm do rebordo costal direito.
  - (D) hipotensão postural.
  - (E) bócio difuso.

- 24.** A anemia relacionada à insuficiência renal crônica está relacionada à deficiência de eritropoietina. No entanto, uma porcentagem dos pacientes não responde ao uso de eritropoietina, e tem níveis de ferro baixos.
- A explicação mais comum a tal fato é:
- (A) redução da absorção de ferro por gastrite atrófica e hipocloridria associada.
  - (B) maior perda de ferro relacionada a ulcerações gástricas.
  - (C) perda de ferro por via intestinal associada a uremia e angiodisplasia intestinal e redução da absorção de ferro pelo aumento da hepcidina.
  - (D) aumento da perda urinária de ferro através da perda de mioglobina/hemoglobina.
  - (E) aumento da atividade inflamatória com sequestro de ferro pelas proteínas inflamatórias.
- 25.** Paciente com anemia falciforme apresenta no hemograma hemoglobina de 9 g/dL com VCM = 96 fL e presença de corpúsculos de Howell Jolly. Tais achados permitem concluir que o paciente provavelmente apresente
- (A) crise aguda de hemólise.
  - (B) asplenia funcional.
  - (C) infarto da medula óssea.
  - (D) crise aplástica.
  - (E) sequestro esplênico.
- 26.** Entre as medidas de rastreamento de câncer de pulmão, a tomografia com baixa radiação é das de melhor custo benefício. Entre os grupos com melhor perfil para o rastreamento anual, estão pacientes entre 55 e 80 anos, carga tabágica acima de 30 maços ano e ex-fumantes que tenham abandonado o tabagismo há
- (A) 10 anos.
  - (B) 12 anos.
  - (C) 15 anos.
  - (D) 20 anos.
  - (E) 25 anos.
- 27.** Um paciente hipertenso em uso de enalapril 10 mg faz uso de 3 latas de cerveja ao dia, mas aumenta com dose de destilados nos fins de semana. Ultimamente, vem tendo crises de dispneia e edema de membros inferiores que pioram nos domingos e segundas-feiras.
- Entre os fatores relacionados ao álcool neste quadro, está(ão):
- (A) vasodilatação direta do álcool e hipotensão.
  - (B) efeito inotrópico negativo e arritmogênico do álcool.
  - (C) redução da absorção de folatos.
  - (D) vasodilatação relacionada ao efeito agudo no fígado.
  - (E) aumento da pressão arterial relacionado ao álcool e à carência de tiamina.
- 28.** Em um paciente com artrite reumatoide, são critérios de pior prognóstico:
- (A) sexo masculino e idade acima de 50 anos.
  - (B) altos títulos de fator reumatoide e acometimento renal.
  - (C) idade inferior a 30 anos e sexo masculino.
  - (D) sexo feminino e gestação.
  - (E) altos títulos de fator reumatoide e idade inferior a 30 anos.
- 29.** Em uma paciente com crises de enxaqueca, qual dos sintomas mais comumente sugerem uma aura e quanto tempo precedem a cefaleia?
- (A) Hipoacusia; 3 horas.
  - (B) Vertigem; 1 hora.
  - (C) Parestesias; 2 horas.
  - (D) Sintomas visuais; 1 hora.
  - (E) Zumbidos; 2 horas.
- 30.** Uma paciente idosa com *déficit* cognitivo importante apresentou piora do nível de consciência, sendo constatada hiponatremia de 128 mEq/L. É diabética, dislipidêmica e tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, bem controlada.
- Qual das medicações está mais habitualmente associada a tal evento?
- (A) Galantamina.
  - (B) Fluoxetina.
  - (C) Sinvastatina.
  - (D) Metformina.
  - (E) Atenolol.

Considere o caso a seguir, para responder às questões de números **31** e **32**.

Paciente com hepatopatia alcoólica apresenta ascite de difícil controle e desenvolveu elevação do nível sérico de creatinina de 0.9 mg/dL para 1,5 mg/dL em 24 horas.

- 31.** Quais parâmetros laboratoriais são mais sugestivos de síndrome hepato renal?
- (A) Sódio urinário de 30 mEq/L e relação de osmolaridade urinária/sélica menor que 1.
  - (B) Sedimento urinário com 20 000 eritrócitos/mL e sódio urinário de 10 mEq/L.
  - (C) Sódio urinário de 7 mEq/L e relação de osmolaridade urinária/sélica menor que 1.
  - (D) Relação de osmolaridade urinária/sélica maior que 1 e sódio urinário de 50 mEq/L.
  - (E) Proteinúria de 600 mg/24 horas e sedimento urinário com 10 000/mL.
- 32.** Entre os fatores mais comumente desencadeadores da injúria renal aguda, estão:
- (A) uso de lactulona e espironolactona.
  - (B) peritonite bacteriana espontânea, furosemida e sangramento digestivo.
  - (C) betabloqueadores, furosemida e dieta hipercalórica.
  - (D) betalactâmicos, lactulona e espironolactona.
  - (E) quinolonas e betabloqueadores.
- 33.** Paciente com 60 anos de idade apresenta edema de face e rouquidão com estridor laríngeo, sendo diagnosticado com angioedema. Nega episódios anteriores ou histórico familiar.
- Com relação a esse quadro, assinale a alternativa correta.
- (A) Corticoide intravenoso é o tratamento inicial de escolha.
  - (B) Adrenalina intramuscular deve ser evitada em pacientes nesta idade.
  - (C) Deve ser solicitada a dosagem de C2 e C4.
  - (D) Fenoxifenadina é o tratamento de escolha.
  - (E) Inalação com adrenalina pode auxiliar na rouquidão.

- 34.** Paciente de 60 anos, tabagista de 30 maços ano, tem tosse e dispneia progressiva. A espirometria mostra FEV<sub>1</sub> de 45% e, no último ano, foi internado por 2 vezes com pneumonia. O hemograma mostra Hbde 17,5 g/dL e hematócrito de 52% com 100 eosinófilos/mL.

A melhor conduta para o caso é:

- (A) budesonida e formoterol inalatórios.
  - (B) budesonida e tiotrópio inalatórios.
  - (C) formoterol e tiotrópio inalatórios.
  - (D) formoterol, tiotrópio e budesonida inalatórios.
  - (E) formoterol, tiotrópio inalatórios e corticoide oral.
- 35.** Uma paciente apresenta artralguas, anemia hemolítica e rigidez matinal de 1 hora. Qual dos exames a seguir tem maior especificidade para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico?
- (A) Fator antinúcleo pontilhado grosso 1/320.
  - (B) Anti Sm positivo.
  - (C) Fator antinúcleo pontilhado fino 1/160.
  - (D) Anti RNP positivo.
  - (E) Redução dos níveis de C3 e C4.
- 36.** Um paciente vem apresentando quadro de anasarca com edema de escrotal importante. O hemograma mostra hemoglobina de 9 g/dL, colesterol de 320 mg/dL, albumina de 1,8 g/dL, creatinina de 1,4 g/dL e urina 1 normal. Entre as possibilidades diagnósticas a seguir, a mais provável é:
- (A) diabetes *mellitus* e síndrome nefrótica.
  - (B) trombose de veia cava inferior e síndrome nefrótica.
  - (C) perda entérica de proteínas por linfoma intestinal.
  - (D) má absorção por doença celíaca.
  - (E) má absorção por pancreatite.
- 37.** A utilização de marcadores tumorais no rastreamento de doenças neoplásicas não é normalmente recomendada. O Ca 125, marcador de câncer de ovário, por exemplo, pode estar alterado em:
- (A) pancreatite crônica.
  - (B) doença inflamatória intestinal.
  - (C) lúpus eritematoso sistêmico.
  - (D) endometriose e ascite.
  - (E) polipose intestinal.

- 38.** A presença de neuropatia periférica está associada, com maior frequência, a deficiência de
- (A) tiamina.
  - (B) vitamina D.
  - (C) vitamina C.
  - (D) piridoxina.
  - (E) ácido fólico.
- 39.** Um paciente apresenta quadro diarreico com epigastralgia, tendo sido diagnosticado como giardíase. Foi tratado por diversas vezes com metronidazol, com melhora temporária.
- Qual dos fatores poderia explicar tal situação?
- (A) Deficiência de IgA.
  - (B) Doença celíaca.
  - (C) Deficiência de IgG.
  - (D) Deficiência de IgM.
  - (E) Hipocloridria.
- 40.** Uma região, após fortes chuvas, teve alagamento de várias residências e, após 10 dias, apareceram alguns casos de febre e mialgias com diagnóstico confirmado de leptospirose. Você atendeu um senhor com um quadro de febre e mialgias que se iniciou 22 dias após a enchente. O hemograma tem  $13400/\text{mm}^3$  com 78% de neutrófilos e com transaminases normais.
- Assinale a alternativa correta com relação ao caso.
- (A) As transaminases normais excluem o diagnóstico.
  - (B) O teste de microaglutinação se positiva 7 dias após o contato.
  - (C) Não se indica o tratamento, exceto nas formas graves.
  - (D) A prescrição de doxiciclina em dose única está indicada.
  - (E) O período de incubação observado é compatível com leptospirose.

