



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

017. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta transparente de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **07**.

Se alguém quer aprender a tocar um instrumento, precisa fazer aulas e praticar. Se a meta é fortalecer os músculos, é fundamental se exercitar com regularidade. Para quem quer ser mais feliz – no trabalho e na vida – a lógica é a mesma: é necessário estimular o cérebro.

Juliana Sawaia, cientista de dados e pesquisadora sobre felicidade no trabalho, explica que a felicidade é um sentimento construído e influenciado por fatores internos e externos. No trabalho, ela passa por motivos como engajamento, paixão e satisfação com o ambiente e a função exercida.

“Não dá para definir se alguém é feliz ou não como se fosse uma pergunta de sim ou não. É uma questão que engloba inúmeros elementos que variam de tempos em tempos para cada profissional”, explica.

Um estudo norte-americano mostrou que os brasileiros têm experimentado emoções negativas no trabalho. Os dados colocaram o Brasil em quarto lugar entre os países com os trabalhadores mais tristes da América Latina.

Não existe fórmula mágica que possa agradar a todos e transformar os trabalhadores em pessoas mais felizes. As exigências mudam bastante de um ser humano para outro. Mas, como uma habilidade, a felicidade pode ser construída no dia a dia. Juliana destaca que, além das responsabilidades das organizações, o profissional também precisa ter a intencionalidade para encontrar o bem-estar.

“A felicidade é um alvo que muda muito. Talvez o que te faz feliz hoje não vá causar o mesmo sentimento amanhã e vice-versa. O ponto é entender no dia a dia como você pode ser um pouco mais feliz”, comenta.

(Geovanna Hora. “Pesquisadora da felicidade indica 5 hábitos para ser mais feliz no trabalho; veja quais são”.

Disponível em: <https://www.estadao.com.br>. 02.01.2025. Adaptado)

01. A partir das informações do texto, pode-se afirmar que

- (A) a felicidade é um estado perene, e, no trabalho, a satisfação com a função exercida contribui para essa permanência.
- (B) o trabalho é a principal causa das emoções negativas vivenciadas pelos brasileiros, embora sejam um povo extremamente feliz.
- (C) a felicidade é inconstante, pois suas razões se alteram ao longo do tempo para um mesmo indivíduo bem como de pessoa para pessoa.
- (D) Juliana Sawaia acredita que conquistar a felicidade é tão simples quanto responder a uma pergunta de sim ou não, basta querer encontrar o bem-estar.
- (E) as corporações são as grandes responsáveis por garantir a felicidade de seus colaboradores, com engajamento e bom ambiente de trabalho.

02. No 1º parágrafo do texto, a autora apresenta

- (A) uma análise sobre como aprender a tocar um instrumento influencia diretamente a capacidade de ser mais feliz.
- (B) um argumento de que aprender a tocar um instrumento e exercitar-se regularmente faz bem ao cérebro.
- (C) uma contraposição entre a capacidade de ser feliz de um lado e a de aprender a tocar um instrumento de outro.
- (D) uma gradação em que aprender a tocar um instrumento é mais fácil do que ser mais feliz no trabalho e na vida.
- (E) uma comparação entre a possibilidade de ser mais feliz e a de aprender a tocar um instrumento ou fortalecer os músculos.

03. “Se a **meta** é fortalecer os músculos, é fundamental se exercitar com regularidade. Para quem quer ser mais feliz – no trabalho e na vida – a lógica é a mesma: é necessário **estimular** o cérebro” (1º parágrafo).

Os termos destacados têm como sinônimo e antônimo, respectivamente:

- (A) compromisso; incentivar.
- (B) acordo; conter.
- (C) objetivo; trabalhar.
- (D) propósito; aticar.
- (E) intuito; acalmar.

04. Está empregada em sentido figurado a palavra destacada no seguinte trecho do texto:

- (A) ... a felicidade é um sentimento **construído** e influenciado por fatores internos e externos. (2º parágrafo)
- (B) No trabalho, ela passa por motivos como engajamento, **paixão** e satisfação com o ambiente... (2º parágrafo)
- (C) É uma questão que **engloba** inúmeros elementos que variam de tempos em tempos... (3º parágrafo)
- (D) Os dados colocaram o Brasil em quarto lugar entre os países com os trabalhadores mais **tristes**... (4º parágrafo)
- (E) O ponto é entender no dia a dia como você pode ser um pouco mais **feliz**”, comenta. (6º parágrafo).

05. Assinale a alternativa em que está reescrito em conformidade com a norma-padrão de emprego da vírgula o seguinte trecho do 4º parágrafo: “Os dados colocaram o Brasil em quarto lugar entre os países com os trabalhadores mais tristes da América Latina.”

- (A) Entre os países com os trabalhadores mais tristes da América Latina o Brasil foi colocado, em quarto lugar.
- (B) Entre os países com os trabalhadores mais tristes da América Latina, o Brasil foi colocado em quarto lugar.
- (C) O Brasil foi, colocado em quarto lugar entre os países com os trabalhadores mais tristes da América Latina.
- (D) O Brasil foi colocado em quarto lugar entre os países com os trabalhadores, mais tristes da América Latina.
- (E) Em quarto lugar o Brasil, foi colocado entre os países com os trabalhadores mais tristes da América Latina.

06. A expressão do texto que está reescrita entre parênteses, segundo a norma-padrão de emprego dos pronomes, é:

- (A) “... precisa fazer aulas...” (precisa fazer-las)
- (B) “... estimular o cérebro...” (estimula-o)
- (C) “... engloba inúmeros elementos...” (lhes engloba)
- (D) “... possa agradar a todos...” (possa lhes agradar)
- (E) “... encontrar o bem-estar...” (encontra-no)

07. No trecho do 4º parágrafo “... os brasileiros **têm experimentado** emoções negativas no trabalho.” a expressão destacada pode ser substituída, preservando seu sentido bem como a norma-padrão da língua portuguesa, por:

- (A) vão experimentar.
- (B) vêm experimentando.
- (C) vieram a experimentar.
- (D) estiveram experimentando.
- (E) estavam para experimentar.

Leia a tira para responder às questões de números 08 e 09.



(Charles M. Schulz. Peanuts. Disponível em: <https://www.facebook.com/tirinhasinteligentess>. 01.08.2020. Adaptado)

08. A partir da leitura da tira, pode-se afirmar que

- (A) a garota defende que a felicidade plena é um sentimento irrefutável.
- (B) a garota entende que cães não têm capacidade para serem felizes.
- (C) a garota convence o cão de que ele não consegue dimensionar a felicidade.
- (D) o cão assume que nem ele é capaz de sentir tanta felicidade.
- (E) o cão considera que talvez seja possível que ele experimente tamanha felicidade.

09. Nas falas dos 2º e 3º quadrinhos “Ninguém pode ser **tão** feliz!” e “**Talvez** ela esteja certa...”, as palavras destacadas expressam, correta e respectivamente, circunstâncias de:

- (A) intensidade e dúvida.
- (B) intensidade e modo.
- (C) afirmação e dúvida.
- (D) modo e afirmação.
- (E) negação e modo.

10. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Não pode-se ser feliz ou talvez tenha estabelecido-se um novo recorde de felicidade.
- (B) Não pode-se ser feliz ou talvez se tenha estabelecido um novo recorde de felicidade.
- (C) Não se pode ser feliz ou talvez se tenha estabelecido um novo recorde de felicidade.
- (D) Não se pode ser feliz ou talvez tenha-se estabelecido um novo recorde de felicidade.
- (E) Não se pode ser feliz ou talvez tenha estabelecido-se um novo recorde de felicidade.

Leia o texto para responder às questões de números 11 e 12.

A Organização Mundial da Saúde define saúde como “o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade”. Os veteranos da área costumam dizer que essa é, na realidade, a definição de felicidade.

Pode ser. Mas a verdade é que os estudos científicos apontam, cada vez mais, para uma estreita relação entre saúde e a condição de ser feliz. O que não é de surpreender. No mundo em que vivemos, as doenças dependem muito de nosso estilo de vida.

Estilo de vida que, por sua vez, é resultado de uma cultura que nos pressiona a consumir mais, a comer mais, a ficar sentados diante da tela da TV, a fumar, a consumir álcool e drogas. Tudo isso, paradoxalmente, traduz-se em insatisfação, porque esse tipo de apelo não tem limites. A insatisfação leva à tristeza, à depressão, associada com várias doenças, como diabetes ou acidente vascular cerebral.

Um estudo mostrou que pessoas idosas que se consideram felizes têm menor probabilidade de ser vítimas de acidente vascular cerebral. Outro estudo mostrou que mulheres deprimidas estão mais propensas a ter o endurecimento das artérias, conhecido como aterosclerose.

Pergunta: por que isso acontece? É a felicidade uma poção mágica, uma panaceia contra doenças? Claro que não. O que acontece é que as pessoas infelizes tendem a adotar, como compensação, o estilo de vida acima citado, que, este sim, causa doença.

‘Sorria’ pode ser, portanto, um bom conselho, na medida em que o sorriso, atributo caracteristicamente humano, possa ser um indicador do sentimento de felicidade. Mas a conquista da felicidade não depende só da pessoa. Se a angústia é demasiada, a ajuda profissional pode ser necessária.

Razão tem a Constituição americana de 1776, quando inclui, entre os direitos fundamentais, o *pursuit of happiness*, a busca da felicidade. Se temos direito à saúde – e a Constituição brasileira de 1988 isso nos garante –, por que não teríamos direito à felicidade – ao sorriso?”

(Moacyr Scliar. “Sorridir para a vida”.

<https://www.academia.org.br.02.01.2006>. Adaptado)

11. O autor do texto defende que

- (A) os conceitos de saúde e felicidade se confundem nas definições da Organização Mundial de Saúde.
- (B) a infelicidade contribui para que as pessoas adotem um estilo de vida prejudicial à saúde.
- (C) a felicidade é atributo humano individual, sendo sua garantia uma responsabilidade particular.
- (D) a Constituição Brasileira de 1988 assegura aos cidadãos a busca pela felicidade.
- (E) são tristes e deprimidas as pessoas que sofrem de diabetes e acidente vascular cerebral.

12. No trecho do 6º parágrafo “‘Sorria’ pode ser, **portanto**, um bom conselho...” o termo destacado indica

- (A) conclusão, podendo ser substituída por “por conseguinte”.
- (B) explicação, podendo ser substituída por “conquanto”.
- (C) explicação, podendo ser substituída por “porquanto”.
- (D) contraste, podendo ser substituída por “entretanto”.
- (E) conclusão, podendo ser substituída por “contudo”.

13. Assinale a alternativa em que a concordância está em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Há estudos atualmente sobre a relação entre felicidade e saúde que defende que pessoas com depressão tende a ser mais doente.
- (B) Existem atualmente estudos sobre a relação entre felicidade e saúde que defendem que pessoas com depressão tende a ser mais doente.
- (C) Está se fazendo atualmente estudos sobre a relação entre felicidade e saúde que defende que pessoas com depressão tende a ser mais doentes.
- (D) Concluiu-se estudos sobre a relação entre felicidade e saúde que defendem que pessoas com depressão tende a ser mais doentes.
- (E) Realizaram-se estudos sobre a relação entre felicidade e saúde que defendem que pessoas com depressão tendem a ser mais doentes.

14. Está em conformidade com a norma-padrão de regência:

- (A) Não comove a ninguém que as doenças sejam decorrentes aos hábitos que escolhemos alimentar.
- (B) Não comove ninguém que as doenças sejam resultantes nos hábitos aos quais escolhemos seguir.
- (C) Não impressiona ninguém que as doenças sejam resultantes dos hábitos que escolhemos adotar.
- (D) Não surpreende a ninguém que as doenças sejam procedentes para os hábitos em que escolhemos acatar.
- (E) Não impressiona a ninguém que as doenças sejam decorrentes dos hábitos dos quais escolhemos aderir.

15. Considere o texto a seguir.

A saúde plena assemelha-se _____ felicidade simples. Sorrir é tão benéfico _____ saúde do homem que o ajuda _____ prevenir doenças como _____ depressão.

Com relação ao emprego do acento indicativo de crase, lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por:

- (A) à ... à ... a ... a
- (B) à ... a ... à ... a
- (C) à ... a ... a ... à
- (D) a ... à ... à ... a
- (E) a ... à ... a ... à

16. As bases para o funcionamento e organização do Sistema Único de Saúde (SUS) estão fundamentadas em princípios e diretrizes que afirmam os direitos conquistados na Constituição Federal. Quando a população encontra barreiras que impedem seu acesso às ações e serviços de saúde, como, por exemplo, a localização geográfica difícil e a falta de transporte adequado, isso contraria um importante princípio do SUS, denominado

- (A) descentralização.
- (B) transversalidade.
- (C) hierarquização.
- (D) universalidade.
- (E) integralidade.

17. Os sistemas de saúde constituem a expressão prática e operacional da proteção social, pelos quais as estruturas dos Estados se organizam com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar das populações. Assinale a alternativa correta sobre o sistema de saúde no Brasil.

- (A) A assistência social, seguro social e seguridade social são os três tipos de sistemas de saúde, que se diferenciam quanto a maior ou menor participação do Estado no seu desenvolvimento.
- (B) Os sistemas de saúde são atividades coletivas, construídas socialmente, em que diferentes atores sociais e políticos interagem para organizar, planejar e executar ações relacionadas à saúde de uma dada população.
- (C) O modelo de seguro social adotado no Brasil implica na responsabilidade do Estado em assegurar a promoção da saúde a todos os cidadãos, sem qualquer forma de discriminação.
- (D) A Constituição Federal definiu as bases do sistema de saúde brasileiro a partir do fortalecimento do modelo vigente voltado para a população inserida no mercado formal de trabalho e da adoção de políticas setoriais voltadas à inclusão daqueles que estão fora do mercado de trabalho.
- (E) É um sistema que depende de contribuições financeiras dos indivíduos e tem como objetivo garantir benefícios em situações de doença, invalidez e morte, e garantir qualidade de vida da população.

18. Atividades voltadas para adoção de práticas sociais e de saúde centradas na equidade, na participação e no controle social, para o favorecimento da mobilidade humana e a acessibilidade e para a difusão da cultura da paz em comunidades, territórios e municípios correspondem a um conceito definido na Política Nacional de Vigilância em Saúde denominado

- (A) análise da situação de saúde.
- (B) rede de atenção à saúde.
- (C) integralidade da atenção.
- (D) modelo de atenção à saúde.
- (E) promoção da saúde.

19. Para analisar a hipótese de que a desigualdade socioeconômica influenciou a distribuição da covid-19 nos maiores municípios brasileiros, foi conduzido um estudo epidemiológico que analisou as taxas de internações e óbitos pela doença registrados no período de março a dezembro de 2020, nos 326 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.

Considerando as informações do enunciado, assinale a alternativa correspondente ao tipo de estudo epidemiológico realizado.

- (A) Transversal.
- (B) Coorte.
- (C) Ecológico.
- (D) Caso-controle.
- (E) Estudo de caso.

20. Reduzir as mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis é uma das metas estabelecidas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dentre os indicadores para o monitoramento dessa meta, a “taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis”

- (A) é calculada considerando a mortalidade de pessoas acima de 70 anos, com foco nas causas externas decorrentes de acidentes e violências.
- (B) não leva em consideração a idade das vítimas e sua medida considera apenas as doenças cardiovasculares e respiratórias.
- (C) mede a quantidade de óbitos entre 30 e 69 anos, considerando doenças como câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas e doenças cardiovasculares.
- (D) é ajustada por idade, sendo exclusivo para os casos de câncer de mama, colo de útero, próstata e aparelho digestivo.
- (E) é calculada apenas para a população de adultos jovens, até 45 anos.

21. Sobre a organização da atenção básica no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta sobre as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

- (A) São responsáveis por atender às necessidades de saúde da população de sua área de cobertura, oferecendo serviços como consultas médicas, vacinação, atendimento odontológico e ações de prevenção, entre outros.
- (B) Prestam o primeiro atendimento de casos traumáticos, estabilizando os pacientes e conduzindo a avaliação diagnóstica inicial para determinar a conduta adequada.
- (C) Foram criadas para facilitar o atendimento de problemas de saúde mais complexos, principalmente nos locais onde os usuários possuem maiores dificuldades de locomoção.
- (D) Possuem custo elevado para manutenção e execução das ações e serviços de saúde, em razão do caráter universal e integral da Atenção Básica.
- (E) Prestam atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes com condições clínicas graves e não graves.

22. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são definidas como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Sobre esse assunto, é correto afirmar:

- (A) fundamentado no princípio da transversalidade, a organização das ações e serviços de saúde nas RAS busca atingir todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação.
- (B) tendo a atenção básica como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, a RAS representa um modelo estratégico para alcançar a integralidade e superar a fragmentação do sistema de saúde.
- (C) tem como referência de território de atuação a divisão administrativa estabelecida pelos Estados.
- (D) os Conselhos de Saúde e os Conselhos de Secretários de Saúde compõem as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (E) a partir da estruturação das RAS, todos os serviços do SUS foram considerados portas de entrada às ações e aos serviços de saúde.

Leia o enunciado a seguir para responder às questões 23 e 24.

Em uma cidade de 20.000 habitantes, o número de casos de dengue tem aumentado significativamente nos últimos meses, causando preocupação nas autoridades de saúde pública. No início do ano de 2024, o município registrou apenas 10 casos confirmados da doença, mas, ao longo de um trimestre, o número saltou para 200 casos, com 20 óbitos.

23. A letalidade da doença nesse período foi de:

- (A) 0,05%
- (B) 0,1%
- (C) 5%
- (D) 10%
- (E) 50%

24. Considerando os níveis de prevenção primária, secundária e terciária, estabelecidos por Leavell e Clarck, assinale a alternativa que corresponde a uma medida de prevenção primária indicada pela gestão pública para o enfrentamento dos casos de dengue na cidade.

- (A) Realização de campanhas de conscientização sobre o combate ao mosquito *Aedes aegypti* nos bairros periféricos.
- (B) Estabelecimento de fluxo rápido para encaminhamentos aos hospitais dos casos diagnosticados, visando ao tratamento precoce dos pacientes.
- (C) Monitoramento e rastreamento de pessoas infectadas com dengue para detectar complicações precoces.
- (D) Elaboração de protocolo para o manejo dos casos e reabilitação dos pacientes que sofreram sequelas graves da dengue.
- (E) Acompanhamento médico nas UBSs dos indivíduos que foram diagnosticados com febre hemorrágica, uma complicação da dengue.

25. A Vigilância Sanitária constitui responsabilidade indelegável do Estado e elemento essencial para a garantia do direito à saúde da população, por meio de ações de controle, fiscalização e regulamentação. De acordo com a Constituição Federal, dentre as competências de fiscalização que cabem ao SUS, inclui-se:

- (A) saneamento básico.
- (B) uso de agrotóxicos adequado nas lavouras.
- (C) produção de bebidas alcoólicas.
- (D) fabricação de vasilhames de vidro para laboratórios farmacêuticos e perfumarias.
- (E) procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem vigente, são consideradas infrações graves, entre outras ações, aquelas que

- (A) provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.
- (B) provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa.
- (C) provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.
- (D) venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
- (E) provoquem debilidade temporária de membro ou função ou as que causem dano moral irremediável na pessoa.

27. Conforme estabelecido pelo Conselho Federal de Enfermagem, no âmbito da atuação da equipe de enfermagem na atenção domiciliar, é atribuição privativa do enfermeiro:

- (A) coletar e registrar dados sobre o usuário, família e/ou rede de apoio voluntária.
- (B) organizar e coordenar as condições ambientais, equipamentos e materiais necessários à produção de cuidado seguro.
- (C) aplicar as medidas de prevenção e, quando necessário, realizar o curativo de lesões por pressão em usuários em regime de internação domiciliar.
- (D) implementar as intervenções relacionadas à administração de dieta por via enteral ou parenteral para usuários em regime de internação domiciliar.
- (E) realizar o registro da atenção domiciliar, intervenções e observações efetuadas no prontuário eletrônico, enquanto documento legal, datando e assinando as anotações realizadas.

28. No que diz respeito à implementação do Processo de Enfermagem (PE), é correto afirmar que

- (A) a seleção dos diagnósticos de enfermagem deve ser realizada a partir da tomada de decisão terapêutica pelo enfermeiro.
- (B) técnicos e auxiliares de enfermagem participam do PE, realizando a evolução de enfermagem e a implementação dos cuidados prescritos e sua checagem, sob a supervisão e orientação do enfermeiro.
- (C) a priorização de diagnósticos de enfermagem é realizada durante o desenvolvimento da etapa de planejamento de enfermagem.
- (D) a etapa de avaliação de enfermagem compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais.
- (E) a etapa de diagnóstico de enfermagem compreende o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde e a determinação de resultados esperados e exequíveis de enfermagem e de saúde.

29. Conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ao elaborar o Procedimento Operacional Padrão (POP) referente ao monitoramento biológico do processo de esterilização por vapor úmido, o enfermeiro responsável deve estabelecer que as leitoras de indicadores biológicos sejam calibradas, no mínimo, a cada

- (A) 6 meses.
- (B) 12 meses.
- (C) 18 meses.
- (D) 24 meses.
- (E) 36 meses.

30. Em uma unidade de pronto atendimento (UPA), ao admitir um adulto vítima de queimadura por calor, o enfermeiro foi informado pela equipe de resgate do SAMU que, até o momento, o paciente já havia recebido 400 mL da fórmula de Parkland calculada em 6400 mL. Uma vez que havia decorrido 1 hora desde o momento do acidente, o enfermeiro deve considerar que, da solução restante, o volume a ser infundido nas próximas

- (A) 7 horas é de 1520 mL.
- (B) 7 horas é de 2800 mL.
- (C) 8 horas é de 3200 mL.
- (D) 16 horas é de 4080 mL.
- (E) 16 horas é de 6000 mL.

31. De acordo com recomendação do Ministério da Saúde, entre outras situações, a administração da vacina raiva (inativada), complementada com a administração do soro antirrábico (SAR) ou, na sua ausência, com a imunoglobulina antirrábica humana (IGHAR), está indicada para a profilaxia da raiva humana pós-exposição ao vírus dessa doença em decorrência de _____ provocada por _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.

- (A) lambedura de lesões superficiais ... equídeos
- (B) mordedura ou arranhadura nas mucosas, no segmento cefálico, nas mãos ou nos pés ... gato, passível de observação por 10 dias, sem sinais sugestivos de raiva
- (C) lambedura em pele íntegra ... macaco ou sagui
- (D) mordedura ou arranhadura nas mucosas ... ovinos
- (E) lambedura de lesões superficiais ... cão, não passível de observação por 10 dias ou com sinais sugestivos de raiva

32. O Ministério da Saúde (2024) enfatiza que o planejamento constitui uma ação fundamental para que as atividades de imunização sejam executadas de maneira plena e efetiva, garantindo aos usuários do SUS o acesso à prestação de um serviço oportuno, seguro e de qualidade.

Assim sendo, assinale a alternativa que associa corretamente as duas colunas a seguir, relacionando processos essenciais para o planejamento das ações de imunização e sua aplicabilidade.

1. Planos nacional, estaduais e municipais de saúde.
 2. Diagnóstico da situação de saúde.
 3. Regionalização de saúde.
 4. Relatório de gestão.
- () Definição de serviços que, pela sua capacidade instalada e localização, são potenciais referências para atendimento de outros grupos populacionais fora de abrangência natural.
 - () Documentação dos resultados alcançados para proposição das recomendações necessárias.
 - () Direcionamento das necessidades de investimento, a fim de subsidiar a programação anual e avaliação, a exemplo, adequação e manutenção da estrutura de rede de frio de 100% das salas de vacinação da rede municipal de saúde.
 - () Direcionamento das ações de imunização para as doenças imunopreveníveis, como a priorização da vacinação contra a febre amarela em áreas com bolsões de não vacinados em vista do aumento inesperado do número de casos.
- (A) 1, 2, 3, 4.
 - (B) 3, 1, 4, 2.
 - (C) 2, 4, 1, 3.
 - (D) 3, 4, 1, 2.
 - (E) 4, 3, 2, 1.

- 33.** Em uma unidade básica de saúde, o técnico de enfermagem procurou o enfermeiro relatando que, após a administração da vacina febre amarela, uma adolescente o informou que estava amamentando seu filho com 4 meses de idade. Frente a essa situação, o enfermeiro deve conversar com a jovem mãe, esclarecendo, entre outros itens, que, de acordo com orientação do Ministério da Saúde, o aleitamento materno deve ser
- (A) suspenso por 10 dias.
 - (B) suspenso por 7 dias.
 - (C) suspenso por 48 horas.
 - (D) mantido normalmente, pois a criança tem mais de 30 dias de idade.
 - (E) mantido normalmente, pois a administração da vacina febre amarela em nutrízes não oferece risco para o bebê.
- 34.** M.A., 28 anos, primigesta, com 12 semanas de gestação, compareceu à unidade básica de saúde acompanhada por seu marido, para consulta de enfermagem de pré-natal. Durante o atendimento, ao analisar os resultados de exames realizados recentemente, o enfermeiro constatou que a gestante era portadora do tipo sanguíneo A Rh⁻ (negativo), fenótipo D fraco, e o seu marido portador do tipo sanguíneo A Rh⁺ (positivo). Frente a essa situação, é correto afirmar que o enfermeiro deve considerar que
- (A) é desnecessário aplicar protocolo de profilaxia para doença hemolítica perinatal (DHP).
 - (B) a gestante deve ser encaminhada ao pré-natal de alto risco para acompanhamento.
 - (C) na 28ª semana de gestação, deverá ser administrada uma dose de 300 µg de imunoglobulina anti-D à gestante.
 - (D) a gestante deverá realizar o teste de Coombs indireto, mensalmente, a partir da 24ª semana de gestação.
 - (E) a gestante deverá realizar o teste de Coombs direto imediatamente, repetindo-o mensalmente até o término da gestação.
- 35.** Em uma unidade de pronto atendimento (UPA), uma multipara foi admitida em período expulsivo. Uma vez que a parturiente optou pelo uso da conduta ativa, no 3º período do parto, o enfermeiro deve estar atento à administração de 10 UI de ocitocina, por via intramuscular,
- (A) após o desprendimento da criança, antes do clameamento e corte do cordão.
 - (B) imediatamente após o clameamento do cordão e antes de seu corte.
 - (C) 5 minutos após o clameamento e corte do cordão.
 - (D) ao serem observados os primeiros sinais de separação da placenta, tais como um pequeno sangramento ou o alongamento do cordão.
 - (E) imediatamente após a dequitação.
- 36.** P.C., 25 anos, solteira, compareceu à unidade básica de saúde para realizar o exame citopatológico para prevenção do câncer de colo uterino. No contexto do Processo de Enfermagem, a usuária informou que nunca havia mantido qualquer tipo de relação sexual e que esta era a primeira vez que faria o exame preventivo. Ao analisar os dados registrados no prontuário, o enfermeiro constatou que P.C. era portadora de HIV, contraído por transmissão vertical, e sua última contagem de CD4 fora de 720 células por mm³.
- Frente a essa situação, de acordo com recomendações do Ministério da Saúde, o enfermeiro deve
- (A) encaminhar P.C. para um Centro de Referência IST/AIDS, pois portadoras de HIV só podem realizar a coleta por profissional especializado disponível nesse tipo de unidade de saúde.
 - (B) realizar a coleta de material para a realização do exame e esclarecer que, se o resultado for normal, necessitará repetir o exame a cada 12 meses.
 - (C) realizar a coleta de material para a realização do exame esclarecendo que, se o resultado for normal, deverá repetir o exame a cada 6 meses no primeiro ano.
 - (D) realizar a coleta de material para a realização do exame e providenciar o encaminhamento de P.C. para colposcopia para complementar a investigação.
 - (E) esclarecer a P.C. que o exame citopatológico só está indicado para mulheres que já iniciaram vida sexual ativa.
- 37.** Em uma unidade básica de saúde (UBS), o enfermeiro está realizando a consulta de enfermagem de puericultura de uma criança com 6 meses de idade, que passará a ser incluída na Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó (NutriSUS).
- Nessa oportunidade, o enfermeiro deve orientar a mãe e o cuidador sobre o uso dos saches, enfatizando que o pó nele contido
- (A) deve ser oferecido duas vezes ao dia: no almoço e no jantar.
 - (B) deve ser misturado em uma parte da comida (papas/purês de frutas ou legumes ou no arroz com feijão), que deverá ser oferecida durante a refeição da criança.
 - (C) pode ser diluído em suco de frutas ou fórmula, caso se observe que a criança os aceita mais facilmente.
 - (D) deve ser aquecido junto com os alimentos em que será acrescido, facilitando sua dissolução.
 - (E) é bem tolerado e não produz qualquer tipo de efeito adverso.

38. Considerando a orientação para a interrupção da amamentação durante o período de viremia pós-vacinação contra a dengue, recomenda-se que lactantes realizem, com no máximo 15 dias de antecedência da data da vacina, a extração e o armazenamento do leite materno para ser oferecido à criança durante esse período. Assim sendo, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde para essa situação, entre outros cuidados, o enfermeiro deve orientar as nutrizes a
- (A) conservarem o leite extraído na prateleira mais alta da geladeira por até 15 dias.
 - (B) limparem as mamas apenas com água limpa antes de massageá-las.
 - (C) deslizarem os dedos sobre a pele, em direção ao mamilo, para promover a saída do leite.
 - (D) não completarem com o leite extraído em outra oportunidade frascos que não fiquem cheios após uma extração.
 - (E) aquecerem em banho maria ou micro-ondas, no momento de uso, apenas a quantidade que o bebê irá tomar.
39. De acordo com recomendação do Ministério da Saúde apresentada na linha de cuidado do adulto com hipertensão arterial sistêmica (2021), ao realizar a estratificação do risco global do paciente hipertenso, o enfermeiro deve considerar como fatores de risco presentes, entre outros itens,
- (A) idade maior que 55 anos para mulheres e maior que 65 anos para homens.
 - (B) tabagismo e triglicérides maior que 100 mg/dL.
 - (C) HDL colesterol menor que 100 mg/dL e colesterol total maior que 150 mg/dL.
 - (D) história prematura de doença cardiovascular em familiares de 1º grau: mulheres com menos de 65 anos e homens com menos de 55 anos.
 - (E) *diabetes mellitus* e LDL colesterol maior que 40 mg/dL.
40. O rastreamento inicial para *diabetes mellitus* tipo 2 (DM2) de A.A., 42 anos, sexo feminino, confirmou que a usuária era portadora de pré-diabetes. Frente a essa situação, o enfermeiro fez as orientações pertinentes sobre modificações no estilo de vida (MEV) e esclareceu que, atualmente, caso a usuária não apresente sinais e sintomas da doença, é recomendado realizar novo rastreamento para DM2 em
- (A) 3 meses.
 - (B) 6 meses.
 - (C) 12 meses.
 - (D) 18 meses.
 - (E) 24 meses.
41. A atropina é um antídoto comumente usado para a ressuscitação em intoxicações graves por
- (A) organofosforados e carbamatos.
 - (B) benzodiazepínicos.
 - (C) opioides.
 - (D) cianeto.
 - (E) monóxido de carbono.
42. Em ambiente extra-hospitalar, um enfermeiro realiza a avaliação de um usuário com 66 anos de idade com queixa de cefaleia, vertigem, distúrbio da marcha e visual unilateral. Suspeitando se tratar de um caso de acidente vascular cerebral (AVC), entre outras ações, o enfermeiro solicitou ao indivíduo que mostrasse os dentes, fechasse os olhos e elevasse os membros superiores, mantendo-os nessa posição por 10 segundos, e que repetisse a frase “O Brasil é o país do futebol”.
- É correto afirmar que, ao realizar essas solicitações, o enfermeiro está aplicando a escala de
- (A) Pfeffer.
 - (B) Lawton.
 - (C) Tinetti.
 - (D) Cicinnati.
 - (E) Katz.
43. O número de horas despendidas em intervenções/atividades de cuidados diretos e indiretos de enfermagem constitui uma das variáveis utilizadas para o dimensionamento de profissionais de enfermagem na atenção primária à saúde. Para tal, de acordo com parecer normativo do Conselho Federal de Enfermagem, são classificadas como atividades de cuidado direto a
- (A) promoção de ações educativas e supervisão dos trabalhadores da unidade.
 - (B) visita domiciliar e o controle de vacinação.
 - (C) consulta de enfermagem e a organização do processo de trabalho de enfermagem.
 - (D) escuta inicial da demanda espontânea e a elaboração e a revisão de protocolos de enfermagem.
 - (E) assistência em exames e as ações educativas dos trabalhadores da saúde.

44. O manejo adequado de conflitos é um desafio constantemente presente na prática gerencial do enfermeiro, que pode utilizar diferentes estratégias para solucioná-los. Entendendo-se a assertividade como o quanto o indivíduo tenta satisfazer suas próprias preocupações ao manejar o conflito e a cooperação, como o quanto a pessoa está aberta para satisfazer as preocupações de outras pessoas envolvidas no conflito, o estilo de resolução de conflitos colaborativo/integrativo
- (A) é assertivo, mas não colaborativo.
- (B) atinge um ponto intermediário em relação às dimensões assertividade e cooperação.
- (C) não é assertivo nem colaborativo.
- (D) é pouco colaborativo e pouco assertivo.
- (E) é tanto assertivo como colaborativo.
45. Em 06.03.2025, primigesta com idade gestacional igual a 11^{2/7} semanas de gestação, diagnosticada recentemente com sífilis secundária, compareceu à unidade básica de saúde para receber a 2ª dose de benzilpenicilina benzatina, 2,4 milhões UI, por via intramuscular, explicando que não conseguiu tomar a medicação devido aos feriados de carnaval. Uma vez que a 1ª dose do medicamento havia sido aplicada em 24.02.2025, o enfermeiro deve determinar
- (A) a aplicação da 2ª dose e considerar a gestante tratada para sífilis.
- (B) a aplicação da 2ª dose e o agendamento da 3ª dose em 7 dias, orientando a gestante sobre a importância de cumprir rigorosamente o intervalo entre as doses.
- (C) o reinício imediato do tratamento, compreendendo a aplicação de 2 doses de benzilpenicilina benzatina, 2,4 milhões UI, por via intramuscular, com intervalo de 7 dias entre elas.
- (D) o reinício imediato do tratamento, compreendendo a aplicação de 3 doses de benzilpenicilina benzatina, 2,4 milhões UI, por via intramuscular, com intervalo de 7 dias entre elas.
- (E) o reinício imediato do tratamento, compreendendo doxiciclina 100 mg, 12/12 horas, via oral, por 15 dias.
46. No que diz respeito ao período de transmissibilidade, de acordo com o Ministério da Saúde (2024), a transmissão da tuberculose _____ pode ocorrer enquanto a pessoa estiver eliminando bacilos. Esse período de eliminação do bacilo pode ser identificado pela positividade do exame _____, em diagnóstico de casos novos, e pela positividade _____ em casos de acompanhamento do tratamento da TB e em situações de retratamento. Com o início do esquema terapêutico adequado, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após _____ de tratamento, encontra-se muito reduzida.
- Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.
- (A) pulmonar ... de cultura de escarro ... da baciloscopia de escarro de controle ... 7 dias
- (B) pleural ... de baciloscopia ou do teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) ... da baciloscopia de escarro de controle ... 15 dias
- (C) laríngea ... do teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) ... de cultura de escarro ... 7 dias
- (D) renal ... do teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) ... de cultura de urina ... 30 dias
- (E) pulmonar ou laríngea ... de baciloscopia ou do teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) ... da baciloscopia de escarro de controle ... 15 dias
47. No âmbito das práticas aplicadas em saúde coletiva, a Terapia Comunitária (TC) é uma ferramenta à disposição dos profissionais da Atenção Básica no campo da Saúde Mental, a ser utilizada no território de atuação.
- Em relação a essa intervenção, é correto afirmar que
- (A) o processo se desenvolve em 3 encontros com participantes fixos, em que são compartilhadas experiências de vida e sabedorias.
- (B) por envolver processos psíquicos, necessita ser realizada em centros de atenção psicossocial (CAPS).
- (C) psicólogos e assistentes sociais são os profissionais que podem assumir o papel de terapeuta comunitário.
- (D) o espaço é aberto, e, para cada encontro, forma-se um grupo em que qualquer usuário, portador ou não de sofrimento ou patologia orgânica e/ou psíquica, pode participar da reunião.
- (E) é atribuição do terapeuta comunitário definir, junto com as equipes de saúde da família, o tema a ser discutido com os participantes a cada reunião.

48. É atribuição comum a todos os profissionais que compõem as equipes de saúde da família (eSF), entre outros itens,

- (A) realizar o acolhimento com classificação de risco.
- (B) responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo, no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado.
- (C) realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local.
- (D) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- (E) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território.

49. O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como um de seus princípios a

- (A) identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- (C) execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador.
- (D) ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e especial atenção à identificação de maus-tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes.

50. O indicador mais recomendado para a análise da assistência obstétrica e neonatal e de utilização dos serviços de saúde é o coeficiente de mortalidade

- (A) neonatal.
- (B) pós-natal.
- (C) infantil.
- (D) por causas específicas.
- (E) perinatal.

