



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 010. PROVA OBJETIVA

#### TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta transparente de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 07.

#### *Por que agora a solidão nos adoece?*

Para Vivek Murthy, cirurgião-geral e principal autoridade de saúde pública dos EUA, “a teoria evolutiva da solidão de John Cacioppo\* está enraizada na observação de que os humanos sobreviveram como espécie não porque temos vantagens físicas como tamanho, força ou velocidade, mas por causa de nossa capacidade de nos conectar em grupos sociais”.

Essa teoria define a solidão como um estímulo para uma necessidade básica: a de nos conectar. “Assim temos uma maior chance de adaptação ao nosso ambiente”, defendeu o psiquiatra Thyago Antonelli-Salgado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

“Se pensarmos nos primatas, humanos e não-humanos, com um comportamento de grupo, eles se protegeram contra a ameaça de predação, a escassez de recursos, e, assim, houve uma seleção natural desses indivíduos”, explicou.

Hoje, todavia, segundo os especialistas, a solidão é mais prevalente e intensa do que nunca e se configura como um grave problema de saúde pública. Em relatório de 2023, Murthy destaca que essa condição está associada a um risco maior de doença cardiovascular, demência, AVC, depressão, ansiedade e morte prematura. “O impacto de estar socialmente desconectado na mortalidade é semelhante ao causado por fumar até 15 cigarros por dia.”

Por enquanto, as principais evidências não são capazes de cravar essa relação de causa e efeito. De qualquer forma, o crescente arcabouço científico tem deixado países em alerta. O Japão criou um “Ministério da Solidão”, e, no Reino Unido, uma secretária foi nomeada para combatê-la.

O ponto chave que envolve a solidão é o sofrimento. Entretanto a redução de interações pode ser feita com um objetivo maior, como autoconhecimento ou necessidade profissional (escrever um livro, por exemplo), não estando, portanto, associada a alguma repercussão negativa. Nesse caso, falamos de solidão.

Antonelli-Salgado aponta que a solidão não pode ser tema abordado apenas na velhice. A importância da conexão social precisa ser ensinada desde cedo. “Muitas vezes, a gente ensina às crianças que, mesmo sem fome, é importante comer para crescer forte. É preciso tomar água para se hidratar. Mas não falamos sobre a importância de ter boas conexões sociais para que haja uma maior qualidade de vida.” Para ele, bons vínculos têm a ver com profundidade, com estabelecer efetivas relações sociais e pensar que elas são sempre uma troca.

(Leon Ferrari. Disponível em: [www.estadao.com.br/saude/a-solidao-nos-ajudou-a-sobreviver-por-que-agora-nos-adoece-especialistas-explicam/?utm\\_source=estadao:mail](http://www.estadao.com.br/saude/a-solidao-nos-ajudou-a-sobreviver-por-que-agora-nos-adoece-especialistas-explicam/?utm_source=estadao:mail). Adaptado)

\* John T. Cacioppo (1951-2018): professor da Universidade de Chicago, onde fundou o Centro da Neurociência Cognitiva e Social.

01. Assinale a alternativa que traz a afirmação correta a respeito do texto.

- (A) A solidão e a necessidade de interações saudáveis e constantes são quesitos que devem ser discutidos especificamente no período da terceira idade.
- (B) John Cacioppo defende que, em detrimento da permanência em grupo, são a potência e as habilidades físicas os atributos essenciais para a sobrevivência dos primatas.
- (C) O termo “solidão” está relacionado à ideia de que, tendo o indivíduo um objetivo coerente a ser alcançado, a diminuição das interações sociais pode ser produtiva.
- (D) Os especialistas alegam que a solidão deveria ter sido vista como um problema de saúde pública desde o início da existência dos seres humanos.
- (E) O sofrimento provocado pela solidão, segundo Vivek Murthy, intensifica-se rapidamente quando o indivíduo também é um fumante compulsivo.

02. É correto afirmar que o texto

- (A) identifica o campo de atuação dos especialistas citados com o intuito de dar credibilidade ao que eles defendem acerca de solidão e saúde pública.
- (B) parte de relatos de pessoas acometidas pela solidão e que buscam soluções para o problema da falta de conexão com outras pessoas.
- (C) apresenta opiniões de profissionais da área da cirurgia e da psiquiatria que divergem quanto à classificação dos problemas de saúde pública.
- (D) deixa subentendido que nosso país deve se pautar pelas ações bem-sucedidas, empreendidas por Japão e Reino Unido, no enfrentamento da solidão.
- (E) reproduz a linguagem complexa dos tratados de medicina, apesar de ser um artigo jornalístico destinado a todos os leitores do periódico.

03. Considere as passagens a seguir:

Por enquanto, as principais evidências não são capazes de **cravar essa relação** de causa e efeito. (5º parágrafo)

**O ponto chave que envolve a solidão** é o sofrimento. (6º parágrafo)

Os trechos destacados podem ser substituídos, respectivamente e sem comprometimento do sentido do texto, por:

- (A) afirmar imediatamente essa ideia; O ponto prescindível que origina a
- (B) demonstrar indubitavelmente essa ligação; O ponto crucial que está associado à
- (C) provar futuramente esse problema; O ponto recorrente que se insurge contra a
- (D) garantir em parte essa conexão; O ponto inexplicável que é a base da
- (E) explicar minimamente esse conceito; O ponto controverso que se mantém exterior à

04. Assinale a alternativa em que as duas conjunções destacadas estabelecem no texto a mesma relação de sentido.

- (A) **Se** pensarmos nos primatas, humanos e não-humanos... (3º parágrafo); ... não estando, **portanto**, associada a alguma repercussão... (6º parágrafo)
- (B) Hoje,  **todavia**, segundo os especialistas, a solidão... (4º parágrafo); **Entretanto** a redução de interações pode ser feita com um objetivo... (6º parágrafo)
- (C) ... não estando,  **portanto**, associada a alguma repercussão... (6º parágrafo);  **Mas** não falamos sobre a importância... (7º parágrafo)
- (D) **Entretanto** a redução de interações pode ser feita com um objetivo... (6º parágrafo); ... efetivas relações sociais **e** pensar que elas são sempre... (7º parágrafo)
- (E)  **Mas** não falamos sobre a importância... (7º parágrafo); ... efetivas relações sociais **e** pensar que elas são sempre... (7º parágrafo)

05. Considere as passagens reescritas do texto:

Com um comportamento de grupo, os primatas **se protegeram contra a** ameaça de predação e escassez de recursos. (3º parágrafo)

Nesse caso, nós **falamos de** solitude. (6º parágrafo)

De acordo com a norma-padrão de regência verbal e nominal, os trechos em destaque podem ser substituídos, respectivamente, por:

- (A) se impuseram sobre a; nos referimos de
- (B) se defenderam pela; fazemos menção à
- (C) se livraram com a; caracterizamos em
- (D) tomaram cuidado à; traduzimos por
- (E) fizeram frente à; definimos como

06. Os parênteses permitem introduzir observação adicional que pode ser suprimida sem interferir na compreensão do texto. É o que ocorre no trecho reescrito em:

- (A) “Assim temos (uma maior chance) de adaptação ao nosso ambiente”, defendeu o psiquiatra...
- (B) Hoje, todavia, segundo os especialistas, a solidão é mais prevalente (e intensa) do que nunca...
- (C) Em relatório de 2023, Murthy destaca que essa condição (está associada) a um risco maior de doença cardiovascular...
- (D) O Japão criou um “Ministério da Solidão”, e, no Reino Unido, (uma secretária) foi nomeada para combatê-la.
- (E) ... têm a ver com profundidade, com estabelecer efetivas relações sociais e pensar que elas (são sempre) uma troca.

07. Considere as frases elaboradas a partir do texto.

A solidão pode ser um estímulo para que estejamos atentos \_\_\_\_ uma necessidade básica: a de nos conectar.

Em seu relatório, Vivek Murthy dá ênfase \_\_\_\_ situações em que a solidão está atrelada a um agravamento da saúde física e mental.

O cirurgião adverte que a mortalidade pelo impacto de se estar socialmente desconectado é similar \_\_\_\_ mortalidade causada pelo fumo.

Atendendo à norma-padrão de emprego do sinal indicativo de crase, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por:

- (A) a; a; à
- (B) a; à; à
- (C) à; a; a
- (D) à; à; à
- (E) à; a; à

08. A frase que está em conformidade com a norma-padrão de concordância verbal se encontra na alternativa:

- (A) Quando precisamos nos adaptar a novos ambientes, existe mais possibilidades de sucesso se evitarmos o isolamento.
- (B) Predação e falta de recursos foram ameaças aos primatas, fato que os levaram a perceber que era mais vantajoso permanecer em grupo.
- (C) Se houver boas conexões sociais, teremos chances de ampliar nossa qualidade de vida e não sucumbir ao sofrimento agravado pela solidão.
- (D) Já se tomou algumas medidas contra os efeitos nocivos da solidão, a exemplo da criação de órgãos públicos que tratem desse tema.
- (E) Devido à extrema solidão, pode surgir problemas graves para algumas pessoas, como doenças cardiovasculares e depressão.

Leia outro trecho do texto inicial da prova para responder às questões de números **09** e **10**.

A pesquisa, com mais de 8 mil pacientes, coordenada por Antonelli-Salgado, identificou efeitos protetores contra a solidão. Para a surpresa dos estudiosos, o mais importante foi a atividade física. Eles acreditam que a explicação é multifatorial. A atividade física possibilita a reunião de pessoas que têm um interesse em comum e também pode ajudar na questão inflamatória do organismo. “À medida que fazemos atividade física, ficamos mais tranquilos, há diminuição da ansiedade e uma melhora da depressão”, declarou o psiquiatra.

(Leon Ferrari. Disponível em: [www.estadao.com.br/saude/a-solidao-nos-ajudou-a-sobreviver-por-que-agora-nos-adoece-especialistas-explicam/?utm\\_source=estadao:mail](http://www.estadao.com.br/saude/a-solidao-nos-ajudou-a-sobreviver-por-que-agora-nos-adoece-especialistas-explicam/?utm_source=estadao:mail). Adaptado)

**09.** Assinale a alternativa em que a rescrita da quarta frase do trecho segue a norma-padrão e apresenta ideias adequadas ao texto.

*A atividade física possibilita a reunião de pessoas...*

- (A) com quem o interesse é comum e, por afinidade, pode auxiliar na questão inflamatória do organismo.
- (B) onde o interesse é comum e, em contraste, pode auxiliar na questão inflamatória do organismo.
- (C) para as quais o interesse é comum e, a despeito disso, pode auxiliar na questão inflamatória do organismo.
- (D) cujo interesse é comum e, além disso, pode auxiliar na questão inflamatória do organismo.
- (E) em quem o interesse é comum e, por analogia, pode auxiliar na questão inflamatória do organismo.

**10.** Considere as seguintes frases:

O especialista e seu grupo realizaram a pesquisa com 8 mil pacientes, e esta surpreendentemente **mostrou a eles** que a atividade física é fator primordial contra a solidão.

Encontros com outras pessoas amenizam a sensação de isolamento, e é a prática esportiva que **proporciona esses encontros** com mais frequência.

De acordo com a norma-padrão de emprego e de colocação de pronomes, os trechos destacados devem ser substituídos por:

- (A) os mostrou; proporciona-lhes
- (B) os mostrou; lhes proporciona
- (C) mostrou-lhes; os proporciona
- (D) lhes mostrou; proporciona-lhes
- (E) lhes mostrou; os proporciona

**11.** Um evento artístico foi organizado por um orientador social, para todos os moradores de uma comunidade. Do total de pessoas dessa comunidade,  $\frac{2}{5}$  eram homens,

$\frac{3}{8}$  do restante correspondiam ao número de mulheres e

45 eram crianças.

Logo, o número de mulheres dessa comunidade era

- (A) 15
- (B) 27
- (C) 48
- (D) 94
- (E) 120

**12.** Em um determinado ponto de ônibus, um ônibus A passa de 18 em 18 minutos, e um ônibus B passa de 24 em 24 minutos.

Se nesse momento, as 8 horas e 22 minutos, os dois ônibus acabaram de passar pelo ponto, o próximo horário que os dois ônibus passarão juntos será às

- (A) 8 horas e 40 minutos
- (B) 8 horas e 58 minutos
- (C) 9 horas e 34 minutos
- (D) 9 horas e 58 minutos
- (E) 10 horas e 22 minutos

**13.** Um agente de administração pública organiza documentos em dois tipos de arquivos, o arquivo intermediário e o arquivo permanente. Foram separados 195 documentos para o arquivo intermediário e 165 documentos para o arquivo permanente. Todos esses documentos devem ser organizados em pastas, cada pasta com o mesmo número de documentos, sendo esse número o maior possível.

Se cada pasta só poderá ter documentos de um mesmo arquivo, então a quantidade de pastas com documentos do arquivo intermediário excederá a quantidade de pastas com documentos do arquivo permanente em

- (A) 5
- (B) 4
- (C) 3
- (D) 2
- (E) 1

14. Um veículo quando abastecido somente com etanol faz 8 km/L. Esse mesmo veículo, quando abastecido somente com gasolina, faz 10 km/L. Esse veículo foi abastecido em um posto de combustível cujo preço do litro do etanol é R\$ 3,84, e o preço do litro da gasolina é R\$ 6,00.

O motorista desse veículo concluiu que, abastecer somente com etanol é mais vantajoso, pois o preço do quilômetro rodado somente com etanol em relação ao preço do quilômetro rodado somente com gasolina é mais barato em

- (A) 5%
- (B) 10%
- (C) 15%
- (D) 20%
- (E) 25%

15. Em um centro de acolhimento, um orientador social atendeu 40 jovens em situação de vulnerabilidade. Ele observou que entre os 40 jovens, para cada 6 meninos atendidos, eram atendidas 4 meninas.

Portanto, entre esses 40 jovens em atendimento, quantos eram meninos?

- (A) 8
- (B) 12
- (C) 16
- (D) 20
- (E) 24

16. Um agente de inclusão escolar levou 35 minutos para organizar 3 prontuários de alunos.

Mantendo o mesmo rendimento de trabalho, o tempo necessário para esse agente organizar 27 prontuários será de

- (A) 5 horas e 15 minutos
- (B) 5 horas e 05 minutos
- (C) 3 horas e 15 minutos
- (D) 3 horas e 05 minutos
- (E) 2 horas e 15 minutos

17. Um cuidador social está preparando suco de laranja para oferecer a um grupo de idosos. Se o suco de laranja for servido em copos de 300 mL, ele renderá 5 copos a menos do que se for servido em copos de 250 mL.

Assim, sabendo que 1000 mL corresponde a 1 L, a quantidade de suco de laranja preparado, em litros, é

- (A) 5,5
- (B) 6
- (C) 6,5
- (D) 7
- (E) 7,5

18. Ao fazer o levantamento de faltas de alunos de uma escola, um agente de inclusão escolar observou que, no primeiro ano, faltaram 4 alunos a menos do que faltaram no segundo ano.

Se o total de faltas dessas duas turmas foi de 8 alunos, então o número de alunos faltantes no primeiro ano foi de

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

19. O salário de um agente administrativo pode variar de acordo com o porte da empresa e o nível profissional, conforme a tabela a seguir:

Porte da empresa	Salário Trainee	Salário Pleno
Grande	R\$ 2.890,00	R\$ 4.500,00
Médio	X	R\$ 3.472,00
Pequeno	R\$ 1.965,00	R\$ 2.600,00

Sabendo que a média aritmética dos salários de agente pleno supera em R\$ 1.165,00 a média aritmética dos salários de agente trainee, então o salário do agente trainee numa empresa de médio porte é:

- (A) R\$ 2.222,00
  - (B) R\$ 2.225,00
  - (C) R\$ 2.228,00
  - (D) R\$ 2.231,00
  - (E) R\$ 2.234,00
20. Um terreno de 150 000 metros quadrados de área foi loteado por uma empreendedora imobiliária. Dessa área, 40% foi destinada a áreas públicas (praças e ruas). A área restante do terreno foi totalmente dividida em lotes retangulares de 15 metros de comprimento por 48 metros de largura.
- Sendo assim, esse terreno foi dividido em
- (A) 75 lotes
  - (B) 100 lotes
  - (C) 125 lotes
  - (D) 150 lotes
  - (E) 175 lotes

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** De acordo com o disposto no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, se, durante o plantão, um técnico de enfermagem deixa de realizar a troca de curativo prescrito para um paciente, expondo-o ao risco de infecção na lesão, está cometendo

- (A) um ato de imprudência.
- (B) um ato de negligência.
- (C) um ato de imperícia.
- (D) uma falha operacional.
- (E) uma falha técnica.

**22.** Durante a verificação dos sinais vitais de um paciente adulto em repouso, o técnico de enfermagem percebe que a frequência cardíaca está acima de 100 batimentos por minuto (bpm).

Esse quadro é denominado

- (A) taquicardia.
- (B) bradicardia.
- (C) hipotensão.
- (D) hipertensão.
- (E) eupneia.

**23.** Para a prevenção de lesões por pressão, os cuidados de enfermagem compreendem, entre outras ações,

- (A) manter o paciente sempre na mesma posição para evitar desconforto.
- (B) selecionar uma superfície de suporte padrão para os pacientes, a fim de redistribuir a pressão.
- (C) incentivar a posição sentada fora da cama em uma cadeira ou em uma cadeira de rodas apropriada por períodos de tempo de, aproximadamente, uma hora.
- (D) hidratar a pele do paciente com hidratantes e umectantes, diariamente, massageando proeminências ósseas e áreas hiperemiadas.
- (E) aplicar talco nas áreas de maior pressão.

**24.** Um paciente com diagnóstico de tuberculose pulmonar ativa iniciou o tratamento há duas semanas, mas relata que se sente melhor e decide interromper o uso das medicações.

Nessa situação hipotética, o técnico de enfermagem deve

- (A) orientar o paciente a interromper a medicação para evitar possíveis efeitos colaterais.
- (B) informar ao paciente que ele pode retornar ao tratamento caso os sintomas reapareçam.
- (C) reforçar a importância do uso contínuo das medicações até o término do tratamento prescrito e comunicar o fato ao enfermeiro.
- (D) solicitar ao paciente que reduza a frequência das doses em vez de interromper o tratamento de imediato.
- (E) comunicar o abandono do tratamento ao serviço de vigilância epidemiológica após 30 dias.

**25.** A ansiedade é um estado emocional apresentado diante de situações de perigo ou estresse, mas, quando excessiva ou constante, pode se tornar um transtorno que afeta a qualidade de vida do indivíduo.

Um dos sinais observados em pacientes durante uma crise aguda de ansiedade é:

- (A) bradicardia.
- (B) hipotensão arterial.
- (C) hipotermia.
- (D) taquicardia.
- (E) miose.

**26.** O técnico de enfermagem (TE) observou que um idoso em estado febril apresenta um quadro de sonolência, desorientação, confusão mental e alteração súbita no comportamento.

Nessa situação hipotética, o TE deve suspeitar que o paciente está apresentando

- (A) um acidente vascular encefálico e administrar, imediatamente, anti-hipertensivos.
- (B) infecção urinária e comunicar o fato à equipe multiprofissional, o mais breve possível.
- (C) desnutrição e ofertar-lhe suplementação nutricional, além de compartilhar a situação com a equipe de saúde.
- (D) hipoglicemia e administrar glicose intravenosa.
- (E) distúrbio psiquiátrico e encaminhá-lo ao serviço de saúde mental.

27. Ao realizar visita domiciliar para acompanhamento de um adolescente com baixo peso e diagnóstico de anemia ferropriva, o técnico de enfermagem deve enfatizar, entre outras, orientações nutricionais, tais como
- (A) ingerir, em todas as refeições, alimentos ricos em calorias, como batata e mandioca (aipim).
  - (B) ingerir suplementos vitamínicos sem necessidade de prescrição de outro profissional.
  - (C) eliminar fontes de cálcio para evitar competição na absorção de ferro.
  - (D) priorizar dietas restritivas para aumentar a absorção de ferro.
  - (E) incluir na dieta alimentos ricos em ferro, como carnes vermelhas, feijão e vegetais de folhas escuras, associados à vitamina C.
28. A via subcutânea para administração de medicamentos está indicada quando a medicação
- (A) precisa ser absorvida rapidamente na corrente sanguínea.
  - (B) necessita de uma absorção mais lenta e contínua.
  - (C) tem alta viscosidade.
  - (D) deve ser administrada em doses grandes para um efeito rápido.
  - (E) deve ser administrada com alta pressão.
29. Uma criança de 12 meses de idade recebeu a vacina tríplice viral e, após 9 dias, apresentou febre de 39,5 °C e erupções cutâneas leves, então os responsáveis a levaram até a Unidade Básica de Saúde.
- Diante dessa situação hipotética, o técnico de enfermagem deve
- (A) informar que se trata de reações esperadas e orientar o uso de medicamentos, conforme prescrição médica.
  - (B) encaminhar a criança imediatamente ao pronto-socorro, independentemente de avaliação prévia por profissional de saúde qualificado.
  - (C) aconselhar que a criança não seja vacinada novamente em futuras campanhas de vacinação.
  - (D) solicitar a suspensão da próxima dose da vacina, pois os sinais indicam uma reação grave à vacina.
  - (E) aconselhar banho frio para reduzir a febre.
30. Frente a um indivíduo adulto em parada cardiorrespiratória (PCR), em ambiente extra-hospitalar, o atendimento adequado à vítima compreende, entre outras ações,
- (A) abrir as vias aéreas, realizar ventilação e depois iniciar compressões torácicas.
  - (B) elevar os membros inferiores antes de iniciar as compressões.
  - (C) providenciar desfibrilador externo automático (DEA) para choque elétrico antes de iniciar as compressões torácicas.
  - (D) oferecer líquidos para tentar reanimar o indivíduo.
  - (E) iniciar imediatamente as compressões torácicas e, em seguida, realizar ventilação.
31. Um paciente sofreu uma queda de altura enquanto trabalhava em uma construção. Ao ser atendido, percebe-se que há uma fratura no membro inferior, com exposição do osso através da pele e sangramento visível.
- Qual deve ser a conduta adequada diante de uma fratura exposta?
- (A) Recolocar o osso no lugar manualmente.
  - (B) Lavar o local com álcool para desinfetar.
  - (C) Cobrir o ferimento com curativo estéril e imobilizar o membro afetado.
  - (D) Aplicar compressão direta sobre o osso exposto.
  - (E) Usar garrote em cima do ferimento para o controle do sangramento.
32. Um surto de doenças infecciosas ocorreu em uma comunidade após fortes chuvas que provocaram enchentes e danificaram a rede de saneamento básico. Diversos moradores apresentaram febre alta, mialgia intensa, cefaleia, tosse e, em alguns casos, hemoptise.
- Com base na situação hipotética, é correto afirmar que a principal suspeita clínica e a medida preventiva mais eficaz para evitar novos surtos, respectivamente, são:
- (A) dengue – eliminar criadouros do mosquito *Aedes aegypti* para evitar sua proliferação.
  - (B) hepatite B – intensificar vacinação na população afetada.
  - (C) tuberculose – aumentar a ventilação nas residências afetadas.
  - (D) leptospirose – evitar o contato direto com água de enchentes, utilizando equipamentos de proteção individual.
  - (E) escabiose – promover campanhas de higiene pessoal.

- 33.** Em relação às doenças de notificação compulsória, deve-se notificar um caso suspeito de meningite bacteriana em
- (A) até 24 horas após a suspeita clínica.
  - (B) até 48 horas após o diagnóstico confirmado.
  - (C) até 7 dias após a suspeita clínica.
  - (D) até 72 horas após o tratamento inicial.
  - (E) surtos epidêmicos.
- 34.** A aplicação de medidas de biossegurança inclui a proteção dos trabalhadores de saúde contra os riscos biológicos presentes no ambiente de trabalho.
- Assinale a alternativa que está de acordo com os protocolos estabelecidos.
- (A) A profilaxia pós-exposição deve ser iniciada quando o trabalhador apresentar sintomas evidentes da infecção.
  - (B) O início da profilaxia pós-exposição deve ocorrer imediatamente após o acidente, mesmo que os sintomas ainda não tenham aparecido.
  - (C) A profilaxia pós-exposição pode ser adiada por até 72 horas, desde que o trabalhador não apresente sinais de infecção.
  - (D) A profilaxia pós-exposição pode ser dispensada caso o contato tenha sido de baixo risco.
  - (E) A avaliação médica é prescindível desde que o trabalhador não apresente sintomas no momento do acidente.
- 35.** De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devem ser classificados como produtos para saúde semicríticos aqueles que
- (A) entram em contato direto com a corrente sanguínea.
  - (B) entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.
  - (C) entram em contato com pele íntegra, sem atingir mucosas ou tecidos profundos.
  - (D) não entram em contato direto com o paciente.
  - (E) são descartáveis ou não requerem limpeza ou esterilização para seu uso.
- 36.** De acordo com as medidas de controle de infecção em ambiente hospitalar, é correto afirmar:
- (A) no processo de limpeza, utilizam-se, basicamente, água, detergente e álcool, removendo sujidades orgânicas e inorgânicas de forma manual ou automatizada.
  - (B) a desinfecção de alto nível elimina esporos bacterianos, vírus e bactérias resistentes.
  - (C) após concluir o processo de esterilização, o controle que garante a qualidade da esterilização se torna dispensável.
  - (D) a escolha entre desinfecção e esterilização depende da classificação do artigo e do risco de infecção associado.
  - (E) a limpeza elimina os micro-organismos patogênicos presentes no material hospitalar.
- 37.** No Brasil, o câncer de colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer de 2022, estima-se que, para 2025, haverá uma incidência de 17 010 casos novos, sendo 15,38 casos a cada 100 mil mulheres.
- Para o rastreamento do câncer de colo do útero, o Ministério da Saúde recomenda, entre outras ações,
- (A) indicar o exame às mulheres que tiverem os 40 anos completos.
  - (B) sugerir o exame para mulheres com sintomas da doença.
  - (C) realizar o exame Papanicolau em mulheres entre 25 e 64 anos, a cada três anos.
  - (D) solicitar o exame de Papanicolau anualmente para todas as mulheres.
  - (E) suspender o rastreamento após os 50 anos, independentemente do histórico anterior.
- 38.** A diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa à melhoria da gestão dos serviços de saúde por meio da transferência de responsabilidades para os Estados e os municípios, com maior autonomia para a organização e a execução dos serviços, é a
- (A) universalização.
  - (B) regionalização.
  - (C) participação popular.
  - (D) integralidade.
  - (E) descentralização.
- 39.** A hierarquização dos serviços, uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), visa a
- (A) organizar os serviços de saúde em níveis de complexidade crescente.
  - (B) centralizar o atendimento em grandes hospitais.
  - (C) reduzir a capacidade de gestão dos serviços de saúde em âmbito local.
  - (D) eliminar o atendimento ambulatorial.
  - (E) transferir a responsabilidade dos serviços para clínicas particulares.
- 40.** A principal função do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) é
- (A) fiscalizar diretamente o exercício profissional nos Estados.
  - (B) representar os enfermeiros perante sindicatos locais.
  - (C) normatizar e fiscalizar o exercício dos profissionais de Enfermagem.
  - (D) oferecer cursos de graduação em Enfermagem.
  - (E) atender diretamente queixas de pacientes contra profissionais.



