



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ – PMG

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL 001/2011 – SEDESC

Cód. 05 – Técnico de Enfermagem

1. Quanto a lei do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar:
 - A) Como foi criada em 1990, é uma lei nova e ainda não sofreu alterações em seu conteúdo.
 - B) A lei dos SUS inclui os serviços públicos e privados de assistência a saúde.
 - C) A lei está inserida em todo país, porém alguns Estados tem cumprido o seu teor parcialmente.
 - D) É uma lei que está parcialmente em vigência no país, já que em seu conteúdo existem normas que contrariam a Constituição Federal, lei maior do país.
2. Sobre o acúmulo de cargos, é correto afirmar:
 - A) Os servidores que legalmente acumulam três cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - B) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - C) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de dois estabelecimentos do Sistema Privado de Saúde.
 - D) Os servidores que irrestritamente acumulam vários cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
3. O Técnico de Enfermagem encaminhou um paciente de maca para realização de exame ao Setor de Radiologia e deixou-o sozinho na sala de espera, sem comunicar aos funcionários responsáveis pelos pacientes neste serviço. Enquanto aguardava o exame, o paciente se sentiu mal, necessitando de atendimento, e acabou evoluindo para óbito. Analisando os fatos e considerando os aspectos éticos, o técnico de enfermagem cometeu:
 - A) imperícia.
 - B) imprudência.
 - C) negligência.
 - D) homicídio culposo.
4. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.
 - () A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, não necessitando de jurisdição específica na área onde ocorre o exercício.
 - () A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
 - () A programação de enfermagem inclui a prescrição médica.
 - () O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem.
 - A) F – V – F – V.
 - B) V – V – V – V.
 - C) F – F – F – F.
 - D) F – F – F – V.

5. Em relação ao Código de ética dos profissionais de enfermagem, é correto afirmar:
- A) Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
 - B) As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem são divididas em apenas 3 tipos: Advertência, Suspensão do exercício profissional e Cassação do direito ao exercício profissional.
 - C) A suspensão consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
 - D) Responde pela infração ética apenas quem a cometer, outros profissionais que participarem da sua prática serão apenas advertidos por escrito.
6. Em relação aos sinais vitais, é correto afirmar que, a temperatura retal é geralmente:
- A) igual ao valor das temperaturas axilar e oral.
 - B) 1,0°C acima da temperatura axilar.
 - C) 0,3°C abaixo da temperatura axilar.
 - D) 0,5°C acima da temperatura axilar.
7. Em relação aos sinais vitais, é considerado normal para um indivíduo adulto:
- A) frequência respiração entre 20 e 30 movimentos respiratórios por minuto.
 - B) pressão arterial de 150 x 70 mmHg.
 - C) temperatura axilar de 37 a 38,5°C.
 - D) frequência cardíaca de 60 a 100 batimentos por minuto.
8. Considerando a técnica para mensuração da altura e peso, é correto afirmar:
- A) Não é necessária a retirada de roupa e/ou sapatos durante a pesagem do paciente.
 - B) Deve-se mover o marcador menor (Kg) do zero da escala até o ponto em que o braço da balança incline-se para baixo e o cursor permaneça abaixo do nível, não havendo equilíbrio entre o peso da escala e o peso da paciente.
 - C) Antes de cada pesagem, a balança deve ser destravada, zerada e calibrada.
 - D) Para verificar a altura, o paciente deve permanecer com tórax e abdome voltados para a haste vertical, com braços estendidos ao longo do corpo.
9. Considerando o controle de infecção, leia as frases abaixo e marque (V) se a afirmativa for verdadeira ou (F) se for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.
- () A lavagem das mãos, isoladamente, não é uma ação importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares.
 - () O uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que envolvam mucosas, sangue ou outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções.
 - () São recomendadas, para a finalidade de anti-sepsia, as formulações contendo mercuriais orgânicos, acetona, quaternário de amônio, líquido de Dakin, éter e clorofórmio.
 - () É obrigatória a existência de uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e de um Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) nas instituições de saúde, sendo definido como um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, tendo como objetivo a redução máxima possível da incidência e gravidade das infecções nosocomiais.
- A) V – V – V – F.
 - B) F – V – F – V.
 - C) V – V – V – V.
 - D) F – F – V – V.
10. Sobre as precauções para transmissão é correto afirmar:
- A) As precauções padrão incluem o uso de barreiras (Equipamentos de Proteção Individual) e são aplicadas todas as vezes em que houver a possibilidade de contato com sangue, secreções e fluídos corpóreos, mucosas e pele não íntegra.
 - B) A precaução para transmissão de aerossóis é um tipo de isolamento em que são incluídas as doenças como cólera e aquelas causadas por microorganismos multirresistentes.
 - C) Para a precaução para transmissão de gotículas, é obrigatório o uso de máscaras N-95 para doenças como sarampo, varicela e tuberculose.
 - D) A precaução para transmissão de contato inclui todas as doenças que necessitem de isolamento com máscaras simples, como exemplo, difteria e doença meningocócica.

11. A prescrição médica do Sr. J.S., Leito 12, consta: Soro Glicosado a 10% de 500 ml para correr em 8 horas, por via endovenosa. O Setor de Farmácia disponibilizou à unidade hospitalar apenas Soro Glicosado a 5% de 500 ml e ampolas de glicose a 50% de 10 ml. Para o técnico de enfermagem preparar o soro prescrito, deverá utilizar _____ ampolas de glicose a 50%. Para administrar o volume prescrito, o gotejamento de infusão, em gotas por minuto, será de _____. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correspondente.
- A) 10 ampolas; 63.
B) 5 ampolas; 63.
C) 5 ampolas e meia; 21.
D) 7 ampolas e meia; 21.
12. Em relação a via intramuscular, é correto afirmar que, devem ser administradas soluções com agulha posicionada a _____, tamanho _____ e quantidade máxima de _____ ml. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
- A) 45° – 13x4,5 – 8
B) 90° – 20x5 – 2
C) 25° – 13x4,5 – 10
D) 90° – 25x7 – 5
13. Em relação à insulino terapia, é correto afirmar.
- A) O frasco de insulina pode ser congelado (temperatura abaixo de 2°), em situações de viagens, para evitar aquecimento e garantir maior eficácia do medicamento.
B) O frasco de insulina deve ser armazenado exclusivamente em temperatura ambiente.
C) A Insulina é um hormônio que deve ser conservado de maneira adequada, para que sejam garantidas as suas propriedades farmacológicas.
D) A insulina deve ser aplicada em adultos e crianças, exceto durante o período gestacional.
14. A insulina NPH:
- A) tem início de ação de 1/2 hora, pico de ação de 1 a 4 horas e duração de 4 a 10 horas.
B) tem início de ação em 2 horas, sem pico de ação e duração de 2 horas.
C) tem início de ação rápida, variando de acordo com cada paciente.
D) tem início de ação de 1 a 3 horas, pico de ação de 5 a 7 horas e duração de 13 a 18 horas.
15. Considerando cuidados importantes na administração da albumina humana, é correto afirmar que, a infusão venosa do medicamento :
- A) deve ser rápida (15 a 30 minutos), porém não em bolus, pois pode acarretar sobrecarga cardíaca no paciente.
B) deve ser lenta (em torno de 3 horas), pois pode causar desidratação do paciente.
C) deve ser em bolus, pois pode perder as propriedades farmacológicas.
D) pode ser realizada juntamente com outros medicamentos, incluindo midazolam, vancomicina e verapamil.
16. Em relação às úlceras de pressão, é correto afirmar.
- A) O primeiro estágio da úlcera de pressão é caracterizado por extensa perda de pele, necrose do tecido subcutâneo.
B) Pacientes acamados podem desenvolver úlceras de pressão, sendo que as áreas mais afetadas na posição de decúbito lateral são: orelha, ombro, trocânter, joelhos e tornozelo.
C) As úlceras de pressão não podem ser prevenidas, pois dependem exclusivamente de fatores relacionados ao paciente.
D) A umidade da pele promove um ambiente favorável para prevenção da úlcera de decúbito, devendo a equipe de enfermagem manter a pele do paciente úmida e hidratada.
17. Baseando-se nos princípios das técnicas de enfermagem, leia as afirmativas abaixo e em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.
- I - A sonda nasogástrica tem a finalidade de estabelecer uma via de alimentação, administração de medicamentos e drenagem do conteúdo gástrico.
II - A sondagem nasoenteral deve ser testada quanto a posição correta da sonda, após sua passagem, injetando um pouco de água e auscultando na região epigástrica.
III - A sonda nasoenteral permite administrar dieta em grande volume e rapidamente, evitando atraso do volume total a ser administrado.
IV - A sondagem nasoenteral pode ser utilizada para drenagem do conteúdo gástrico.
- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas a afirmativa I está correta.
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

18. Em relação a coleta de material para exames laboratoriais, o tempo entre a coleta e centrifugação do sangue não deve exceder:
- A) doze horas.
 - B) seis horas.
 - C) uma hora.
 - D) oito horas.
19. Em relação aos cuidados com oxigenoterapia, leia as frases abaixo e marque (V) se a afirmativa for verdadeira ou (F) se for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.
- () É recomendada a umidificação do oxigênio quando administrado no paciente.
 - () A inalação é um procedimento realizado exclusivamente com oxigênio, sem necessidade da prescrição médica.
 - () O cateter nasal deve ser estéril e descartável, e alternado a narina para evitar escoriações.
 - () O cateter nasofaríngeo é considerado um sistema de baixo fluxo, não necessitando de umidificação do oxigênio.
- A) V – V – V – V.
 - B) V – F – V – F.
 - C) F – F – V – V.
 - D) V – V – V – F.
20. Em relação ao princípio da técnica de curativo, é correto afirmar que:
- A) deve-se limpar a ferida infectada com movimentos de dentro para fora da lesão e a ferida limpa com movimentos de fora para dentro da lesão.
 - B) a limpeza das feridas limpa e infectada deve ser realizada com movimentos giratórios de dentro para fora da lesão.
 - C) deve-se limpar a ferida infectada com movimentos de fora para dentro da lesão e a ferida limpa com movimentos de dentro para fora da lesão.
 - D) a técnica de curativo não necessita ser asséptica e não há sequência de movimentação de limpeza.
21. Em relação à doença coronariana, leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta.
- I - A principal causa da doença coronariana é a aterosclerose.
 - II - O atendimento a pacientes com dor torácica na sala de emergência é tempo-dependente. Portanto, é imprescindível a abordagem inicial rápida ao paciente, a qual consiste em monitorização multiparamétrica, punção venosa e instalação de cateter de oxigênio.
 - III - A síndrome coronariana aguda compreende uma variedade de estados isquêmicos, que englobam angina instável, infarto agudo do miocárdio sem supradesnívelamento do segmento ST e infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST, em que a resultante é a instabilidade da placa aterosclerótica.
- A) Todas as afirmativas estão corretas.
 - B) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
 - C) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
 - D) Apenas a alternativa II está correta.
22. Em relação ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta.
- I - A maioria dos AVCs envolve a circulação cerebral anterior e quando acomete a artéria cerebral média, o paciente pode ter afasia, disfasia, dificuldade de ler, incapacidade de escrever, falhas do campo visual e hemiparesia do lado afetado.
 - II - A causa mais comum do AVC é a trombose.
 - III - Aterosclerose, hipertensão, tabagismo e arritmias não são considerados fatores que aumentam o risco do AVC.
- A) Todas as afirmativas estão corretas.
 - B) Apenas a afirmativa II está correta.
 - C) Todas as afirmativas estão incorretas.
 - D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
23. O eletrocardiograma consiste de 12 derivações, que registram a atividade elétrica conforme se propaga através do coração, por meio de eletrodos colocados na superfície cutânea em posições anatômicas padronizadas. Em relação ao posicionamento dos eletrodos e a representação das derivações, é correto afirmar que:
- A) para obter a derivação V3, o eletrodo deve ser posicionado no quinto espaço intercostal com a borda esternal direita.
 - B) para obter a derivação V5, o eletrodo deve ser posicionado no quinto espaço intercostal direita, entre V4 e V7.
 - C) para obter a derivação V6, o eletrodo deve ser posicionado no quarto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda.
 - D) para obter a derivação V1, o eletrodo deve ser posicionado no quarto espaço intercostal com a borda esternal direita.

24. O procedimento de remoção de sujidade, sendo executado por meio de fricção com escovas e do uso de soluções de limpeza é denominado:
- A) limpeza automatizada.
 - B) desinfecção de alto nível.
 - C) limpeza manual.
 - D) desinfecção de baixo nível.
25. Em relação aos instrumentais cirúrgicos, é correto afirmar que:
- A) envolvem uma enorme variedade de artigos que se classificam como críticos, sendo utilizados nos mais diversos procedimentos anestésico-cirúrgicos.
 - B) apenas os instrumentais usados e velhos tendem a ser magnéticos nas caixas de acondicionamento, nas ranhuras e articulações, tornando-se rígidos e manchados, por causa da transferência do magnetismo.
 - C) durante a limpeza, os instrumentais cirúrgicos devem permanecer o maior tempo possível em solução salina.
 - D) Se deve dar preferência a limpeza manual ao invés da limpeza automatizada, pois, além de obter um melhor resultado, também evita a exposição do profissional ao risco ocupacional.
26. O Sr. N.O.P., 56 anos, durante admissão no Pronto Socorro apresentou parada cardiorespiratória. Foi necessária a realização da Reanimação Cardiopulmonar. A relação compressão-ventilação recomendada para um ou dois socorristas, até que uma via aérea avançada seja estabelecida é de:
- A) 20:2.
 - B) 5:2.
 - C) 30:2.
 - D) 3:1.
27. Em relação as recomendações atuais de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), é correto afirmar que, houve alteração na sequência de RCP, devendo ser iniciada por:
- A) abertura de vias aéreas.
 - B) ver, ouvir e sentir.
 - C) ventilações.
 - D) compressões torácicas.
28. Em relação às recomendações atuais de primeiros socorros, o prestador de primeiros socorros frente a um indivíduo com desconforto torácico é incentivado a:
- A) apenas acionar o sistema de Serviço Médico Emergência (SME) e iniciar a Reanimação Cardiopulmonar com ventilações.
 - B) solicitar ao paciente para procurar o serviço de pronto atendimento.
 - C) acionar o sistema de Serviço Médico de Emergência (SME) e enquanto aguarda a chegada do SME, aconselhar o paciente a mastigar uma aspirina adulta (sem revestimento entérico) ou duas aspirinas infantis de dosagem mais baixa, se o paciente não tiver histórico de alergia a aspirina ou de hemorragia gastrointestinal recente.
 - D) aconselhar o paciente a mastigar um captopril, se o paciente não tiver histórico de alergia.
29. Em relação a Hanseníase, é correto afirmar.
- A) A infecção é uma doença transmissível, que acomete preferencialmente a pele e o sistema nervoso periférico, podendo também invadir as mucosas nasal, orofaríngea e laríngea, olhos e vísceras, restringindo ou mesmo impedindo as atividades profissionais.
 - B) É uma doença causada pelo vírus da varicela, que acomete principalmente pessoas idosas, podendo desenvolver o herpes zóster.
 - C) É uma doença não transmissível, que apenas se desenvolve com a queda da imunidade do indivíduo, comprometendo membros inferiores e membros superiores.
 - D) É uma doença transmissível, causada por um protozoário, através da picada do mosquito flebótomo. Após picada do mosquito, os protozoários inoculados no organismo invadem o sistema nervoso central e periférico, causando lesões de amortecimento em membros inferiores e superiores.
30. A Malária é uma doença causada por um protozoário do gênero _____, sua transmissão ocorre por meio da picada do _____. Na fase aguda da doença, o paciente apresenta febre entre _____. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correspondente.
- A) Epstein-Barr – mosquito do gênero Herpesviridae – 37°C a 38°C
 - B) Paracoccidioides – carrapato – 40°C a 41°C
 - C) Plasmodium – mosquito do gênero Anopheles – 39°C a 41°C
 - D) Trypanossoma – triatomídeo (barbeiro) – 38°C a 39°C

31. Considerando a assistência ao recém nascido na sala de parto, leia as afirmativas abaixo e em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.
- I - Na assistência ao recém nascido, durante o nascimento, é obrigatória a passagem de sonda gástrica pelo trato digestório e pelo ânus, com o objetivo de avaliar a existência de atresia de esôfago, obstrução intestinal alta bem como a ocorrência de ânus imperfurado.
 - II - Clampear o cordão umbilical a uma distância de 10 cm do anel umbilical.
 - III - Utilizar nitrato de prata a 1% para promover a profilaxia contra infecção herpética.
 - IV - Encaminhar o recém nascido clinicamente estável para o alojamento conjunto com a mãe.
- A) Todas as afirmativas estão incorretas.
 - B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
 - C) Apenas a afirmativa IV está correta.
 - D) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
32. Em relação ao escore de Ápgar, é correto afirmar.
- A) Deve ser avaliado em dois momentos: ao nascimento e após 15 minutos de vida.
 - B) O escore de Ápgar tem a finalidade exclusiva de avaliar a necessidade de reanimação cardiopulmonar.
 - C) O escore de Ápgar avalia frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.
 - D) O escore de Ápgar não tem sido mais utilizado na sala de parto, sendo realizado apenas após 8 horas de vida do recém nascido.
33. Durante a assistência à parturiente, são importantes a avaliação e a confirmação do verdadeiro trabalho de parto, evitando, desse modo, intervenções desnecessárias. Baseando-se nas contrações, a fase ativa compreende:
- A) a dilatação do colo até 3 cm com contrações leves, sem padrão regular, e queixas referidas pela parturiente de desconforto abdominal.
 - B) a ausência de contrações ou presença de contrações leves, acompanhadas as vezes de dilatação em fase inicial.
 - C) o início da dilatação do colo até 1 cm, com contrações leves e possível ruptura das membranas.
 - D) a dilatação do colo a uma velocidade maior, encontrando-se com 4 cm ou mais, padrão contrátil regular com contrações mais intensas e frequentes.
34. É correto afirmar que, lóquios:
- A) constituem um processo comum de adaptação do sistema tegumentar no período pós parto imediato, reduzindo a quantidade de líquido retido durante a gravidez. Esse processo ocorre com maior frequência no período noturno.
 - B) são contrações uterinas típicas da fase de pós parto imediato, que contribuem para o retorno do colo uterino a seu estado de pré-gravidez.
 - C) consistem em perdas vaginais que a mulher apresenta no pós parto. São constituídos por coágulos dissolvidos, exsudatos produzidos no interior do útero.
 - D) compreendem uma perda anormal de sangue no terceiro trimestre de gravidez, podendo ocasionar o óbito fetal imediato.
35. Na assistência pré-natal, a medida da altura uterina:
- A) tem o objetivo de estimar o crescimento fetal, correlacionando-se a medida da altura uterina com o número de semanas de gestação.
 - B) deve ser realizada posicionando a paciente em decúbito dorsal e determinar a borda superior do umbigo e o fundo uterino.
 - C) visa estimar o bem estar fetal, sendo considerados parâmetros de normalidade para o crescimento uterino o percentil 50 para o limite inferior, e o percentil 70, para o limite superior.
 - D) tem o objetivo de detectar precocemente a ocorrência de edema patológico.
36. Considerando os marcos do desenvolvimento, olhar para a pessoa que a observa e mostrar sensações de prazer e desconforto são respostas esperadas para uma criança de:
- A) 6 a 9 meses.
 - B) 12 meses.
 - C) 1 a 3 meses.
 - D) 15 meses.

37. Em relação ao aleitamento materno, leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta.

- I - A prática do aleitamento materno é evidenciada não apenas na cobertura de requerimentos nutricionais do lactente, mas como prevenção de doenças e morte precoce, e com extensão de seus efeitos biológicos durante todo o ciclo da vida.
 - II - Durante o período de amamentação é recomendada a utilização de pomadas ou cremes no mamilo para fortalecimento da pele e maior proteção contra rachaduras futuras.
 - III - O aleitamento materno exclusivo significa que o único leite que a criança faz uso é o humano, mas pode fazer uso também de líquidos, como água, suco de frutas, chás e medicamentos.
 - IV - O aleitamento materno complementado significa que além do leite humano, a criança recebe outros alimentos.
- A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

38. Em relação ao Sarampo, é correto afirmar que:

- A) é uma doença aguda infecciosa causada por um vírus do gênero Morbillivirus, sendo prevenida por meio de vacinação.
B) seu tratamento deve ser realizado no ambiente hospitalar para administração de antibióticos e hidratação endovenosa, conforme prescrição, pois trata-se de uma doença grave e rara na infância.
C) é uma doença não transmissível, causada por uma bactéria, porém, a equipe de saúde deve estar atenta para os sintomas precoces tendo em vista a alta mortalidade em crianças menores de 5 anos.
D) é uma doença transmissível, causada por uma bactéria, sendo que a equipe de saúde deve estar atenta para os sintomas precoces, pois não há vacinação específica para essa patologia .

39. Preencha as lacunas abaixo e assinale a alternativa correspondente.

A Hipertensão Arterial é uma doença definida pela persistência de pressão arterial sistólica acima de _____ e diastólica acima de _____, sendo atualmente considerada um dos principais fatores de risco para _____.

- A) 120mmHg – 80mmHg – doenças cardiovasculares
B) 140mmHg – 90mmHg – doenças cardiovasculares e cerebrovasculares
C) 160mmHg – 80mmHg – doenças cerebrovasculares
D) 145mmHg – 70mmHg – doenças cardiovasculares e cerebrovasculares

40. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação da Criança, as vacinas que deverão ser administradas ao nascer são:

- A) apenas a Vacina BCG, em dose única.
B) primeira dose da Vacina BCG; a primeira dose da vacina contra Hepatite B; a primeira dose da vacina meningocócica C (conjugada).
C) vacina BCG, em dose única; e primeira dose da vacina contra Hepatite B.
D) vacina BCG, em dose única; e primeira dose da vacina contra Haemophilus influenza b (conjugada).

41. A Vacina Oral de Rotavírus Humana (VORH) previne:

- A) pneumonia por rotavírus.
B) pneumonia, otites, meningites e outras doenças causadas por rotavírus.
C) difteria e diarreias causadas por vírus.
D) diarreia por rotavírus.

42. Em relação a Vigilância Epidemiológica, leia as frases abaixo e marque (V) se a afirmativa for verdadeira ou (F) se for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Vigilância Epidemiológica é o alerta permanente em relação à frequência e distribuição das doenças e dos fatores ou condições que propiciam o aumento do risco de transmissão ou gravidade das doenças.
() As notificações compulsórias das doenças são ações da Vigilância Epidemiológica e possibilitam a descoberta de casos novos para desencadear o mais rapidamente possível o processo de profilaxia.
() As notificações compulsórias das doenças são realizadas apenas por meio de busca ativa da vigilância epidemiológica, não sendo necessária a comunicação dos casos suspeitos ou confirmados pelos profissionais de saúde.

- A) V – V – V.
B) V – F – F.
C) F – F – F.
D) V – V – F.

43. Considerando a Atenção à Saúde do Idoso, leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta.
- I - É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
 - II - O Poder Público deve fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
 - III - Ao idoso internado ou em observação, com mais de 65 anos de idade, é assegurado o direito a acompanhante, devendo a instituição de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral.
- A) Todas as afirmativas estão corretas.
 - B) Apenas a afirmativa I está correta.
 - C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - D) Apenas a afirmativa III está correta.
44. Considerando a Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, é correto afirmar.
- A) O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, exceto aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
 - B) As instituições de saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, apenas nos casos de internação de criança até 12 anos incompletos.
 - C) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
 - D) Considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezesseis anos de idade.
45. Considerando as estratégias para a detecção precoce do câncer de mama, é correto afirmar que:
- A) o auto-exame das mamas não é importante, devendo ser substituído pelo exame clínico mensal das mamas por profissional especializado.
 - B) apenas o exame clínico anual das mamas é suficiente para detectar precocemente o câncer de mama.
 - C) apenas a realização da mamografia a cada 5 anos é suficiente para detectar precocemente o câncer de mama.
 - D) o auto-exame das mamas é de extrema importância e deve ser realizado pela mulher mensalmente.
46. O Câncer de colo uterino constitui um grave problema de saúde pública, que atinge as mulheres em todo mundo, sendo uma doença de evolução lenta e associada à:
- A) infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV).
 - B) ação do estrogênio.
 - C) ação da testosterona.
 - D) infecção pelo *Treponema pallidum*.
47. _____ constitui-se da fração de plasma insolúvel ao frio, obtida a partir do plasma fresco congelado (PFC). Sua administração deve ser feita _____, pois observa-se uma rápida perda de atividade do Fator VIII em altas temperaturas. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
- A) Concentrado de Plaquetas (CP) – em duas horas após o descongelamento
 - B) Concentrado de hemácias – em uma hora após o preparo
 - C) Crioprecipitado (CRIO) – logo após o descongelamento
 - D) Plasma fresco congelado (PFC) – em até seis horas após o descongelamento
48. As atividades que envolvem a quantidade, a qualidade, a conservação e solicitação de reparos, até o armazenamento adequado dos materiais são:
- A) de responsabilidade exclusiva da manutenção.
 - B) também de responsabilidade da equipe de enfermagem.
 - C) de responsabilidade exclusiva do setor de almoxarifado de uma instituição.
 - D) de responsabilidade exclusiva da direção da instituição.
49. O processo de observação e registro da quantidade de líquidos administrada e eliminada pelo indivíduo no período de 24 horas, objetivando a verificação de perdas e/ou ganhos de líquidos e eletrólitos é chamado de:
- A) Balanço Nitrogenado.
 - B) Balanço Nutricional.
 - C) Volemia.
 - D) Balanço Hídrico.

50. Em relação aos cuidados de enfermagem na terapia nutricional enteral, é correto afirmar.

- A) Não é recomendado administrar medicamentos pela sonda nasoenteral para evitar a obstrução do acesso enteral.
- B) Não é recomendado realizar movimentos uniformes e periódicos do frasco de dieta para diluição adequada, pois pode facilitar a perda das propriedades nutricionais do produto.
- C) A dieta enteral deve ser armazenada em temperatura ambiente para evitar perdas das propriedades nutricionais.
- D) Recomenda-se a irrigação da sonda enteral antes e após administração de medicamentos e da dieta para evitar a obstrução do acesso enteral.